

veloppe sa puissance stimulatrice, etc..., avec un extrême rapidité et ses effets ont peu de durée aux doses qui ne produisent pas de lésion.

Douze heures après la chute de la température, on éloigne les doses toutes les trois ou quatre heures, mais toujours nuit et jour.

Voici la formule que nous avons adoptée :

Teinture d'Opium .....	35 gouttes
Teinture de Belladone .....	35 gouttes
Chlorhydrate d'ammoniaque .....	4 grammes
Sirop de fleur d'oranger .....	25 grammes
Sirop simple .....	75 grammes
Aqua Q. S. ....	pour 250 grammes

Dose : Une cuillerée à bouche toutes les deux heures, nuit et jour.

*Dr. Gérin-Lajoie,*

1er Déc., 1917.

Chirurgien au Val-de-Grâce.

## NOTES DE PÉDITRIE

### VULVO-VAGINITE DES PETITES FILLES

Cette affection est souvent de nature gonococcique. On la traite avantageusement avec de l'acide tannique. Voici comment on procède. Au moyen d'une fontaine on lave la vulve et le vagin avec une solution au permanganate de potasse (1 pour 10,000). Le tout doit se faire sans pression ; puis on assèche les parties avec du coton absorbant. En ouvrant les lèvres et le vagin, on soupoudre une couche épaisse d'acide tannique, puis on applique un tampon de ouate maintenu au moyen d'un bandage. A chaque fois que l'enfant urine, on renouvelle l'application de poudre tannique. Ce topic a une action légèrement antiseptique, si bien que les cas, même rebelles, cèdent à ce traitement dans l'espace d'une à 2 semaines. La technique, comme on le voit, est des plus simples.

\* \* \*

### VOMISSEMENTS PÉRIODIQUES

On appelle ainsi les vomissements qui, au cours de l'enfance, reviennent par crises, à toutes les 3 ou 4 semaines, quelquefois plus, et qui débütent brusquement pour cesser de même.

J'avais lu il y a quelques années, dans un périodique américain, que l'usage du bicarbonate de soude avait une action préventive. J'ai depuis appliqué ce traitement, et avec succès, non seulement chez les enfants, mais même chez les adultes migraineux vomisseurs. Chez les enfants, je fais prendre 1 à 2 grains de bicarbonate de soude, 3 fois par jour ; et chez les adultes de 15 à 20 grains. Dans tous les cas, j'ai vu les attaques s'éloigner.—A.J.

\* \* \*