

crevasses fassent leur apparition, il faudra de toute nécessité suivre fidèlement toutes les règles plus haut énoncées dans le double but de guérir ces lésions souvent très douloureuses, et d'en prévenir les conséquences fâcheuses.

Quand les fissures et les crevasses sont formées, il faut protéger le mamelon contre la bouche de l'enfant avec un bout de sein artificiel, ou au moyen d'un morceau de baudruche gommée taillée exprès et percée au centre de plusieurs petits trous qui correspondent aux orifices des canaux galactophores. La baudruche emboîte le mamelon et est collée à la peau à l'aide de collodion. On peut encore faire usage de la tétérèlle biaspiratrice d'Auvard.

Certaines gerzures du mamelon guérissent facilement et promptement parce qu'elles sont simplement traumatiques ; éloignez la cause qui les produit (allaitement) et elles disparaissent. D'autres compliquées par la présence des microbes se cicatrisent difficilement.

Lusk (1) prétend " que, par la seule propreté et l'enlèvement des principes irritants, les écorchures les plus sérieuses du mamelon guérissent dans l'espace de vingt-quatre à quarante-huit heures, à condition toutefois que l'allaitement soit suspendu. Aussi, le but du traitement est-il de guérir la lésion, en s'abstenant absolument de mettre l'enfant au sein malade. Cette condition est aisément réalisée quand un seul des mamelons est écorché, car l'enfant peut suffisamment s'allaiter avec le lait fourni par la mamelle non malade. Mais il faut, en pareil cas, diminuer la tension excessive qui résulte de la suspension de l'allaitement, en comprimant, avec les mains, la mamelle mise au repos, de la base vers le sommet, ou bien en chargeant la sage-femme de tirer le lait directement avec la bouche, *une pipe en terre ordinaire*, ou en se servant d'une pompe appropriée, munie d'une extrémité large et en forme de cône. On peut, en même temps, activer le travail de cicatrisation par des lotions avec des solutions à base de plomb, des solutions tanniques, et l'application de pommades astringentes."

Charles s'élève contre l'emploi des pommades et solutions saturnines (eau blanche, extrait de saturne, nitrate de plomb, etc.) qui sont préjudiciables à l'enfant.

Contre les simples gerzures, il suffit de faire des badigeonnages de teinture de benjoin, après chaque tétée, et de se servir de bout de sein artificiel. Charles remplace quelquefois la teinture par la pommade suivante :

R. Teinture de benjoin.....	} à 1 gramme
Baume du Pérou	
Vaseline.....	
	8 grammes

Mais comme la teinture de benjoin et la pommade ne sont pas sans occasionner de la douleur et de la cuisson, on peut y ajouter de la cocaïne et prescrire ainsi :

R. Teinture de benjoin.....	10 grammes
Chlorhydrate de cocaïne.....	50 centigr.

(1) Lusk : The science and art of midwifery.