

L'ACIDE CARBOLIQUE DANS LES MALADIES DES ENFANTS.

PAR N. S. DAVIS, M. D., CHICAGO.

Depuis deux ans, j'ai prescrit l'acide carbolique très souvent et dans un grand nombre de conditions morbides. Dans différents états d'irritation ou de sensibilité malade des membranes muqueuses du canal alimentaire, spécialement chez les enfants, je lui ai reconnu beaucoup de valeur. La relation de quelques cas servira mieux que tout autre moyen à en faire apprécier les effets dans les maladies intestinales des enfants.

1er Cas. A. B., enfant âgé de huit mois, non sevré. Les intestins avaient été légèrement relâchés pendant trois ou quatre jours, les évacuations plus aqueuses et plus nauséabondes que d'habitude, mais répétées seulement trois fois par jour, jusqu'au 3 Juillet 1870. Alors il s'établit une diarrhée active, les selles étant très claires et d'une couleur verdâtre, accompagnées du vomissement immédiat de toutes les matières introduites dans l'estomac. Ce n'était pas le vomissement actif d'un choléra-morbus grave, mais cette sensibilité morbide de l'estomac qui cause la rejection des *ingesta* et une sérieuse diarrhée. Il n'y avait pas de réaction fébrile, mais plutôt une pâleur et un refroidissement de la surface. Je conseillai à la mère d'allaiter l'enfant plus souvent, mais peu à la fois et de ne lui donner aucun breuvage excepté une ou deux cuillerées à thé à la fois d'eau froide et de mucilage. Je lui donnai l'ordonnance suivante :

Acide carbolique cristallisé	3 grains
Glycérhine.....	un demi once
Tre. Opii Camp.....	un demi once
Eau.....	deux onces

Administrez 20 gouttes toutes les 2 heures, jusqu'à ce que l'estomac et les intestins soient apaisés.

Lorsqu'il n'y aura pas eu d'évacuations ni par haut ni par bas pendant douze heures, alors allongez à trois heures les intervalles entre les doses. Sous l'effet de ce traitement,