

PÉDIATRIE

Des paralysies chez les nouveau-nés.—Les nouveau nés présentent assez fréquemment des paralysies consécutives à l'accouchement et qui sont l'hémiplégie faciale, la paralysie d'un bras, l'hémiplégie ou la paraplegie.

Ces paralysies sont en général le résultat d'une compression des nerfs par les manœuvres obstétricales du forceps et de la version ou le résultat d'une compression du cerveau par le passage de la tête dans un bassin rétréci. En voici un exemple pris par M. le Dr Roulland dans le service de M. BOUILLY :

Accouchement normal chez une secondipare.—*Bassin légèrement aplati.*—*Paralysie faciale périphérique gauche de l'enfant.*—*Guéri son rapide.*—Le 20 avril, la femme M... se présente au pavillon Velpau (Maternité de Cochin), service de M. Bouilly.

Elle est en travail depuis six heures du matin.

A son arrivée (cinq heures du soir), on trouve la tête bien engagée, mais encore un peu haut. La flexion n'est pas complète. La position est une G A.

Le travail continue régulièrement et l'accouchement spontané a lieu à minuit quarante-cinq.

Durée totale du travail : près de quinze heures.

Agée de 21 ans, la parturiente n'avait jamais eu de maladies.

Une première grossesse, il y a deux ans, s'était terminée par la venue à terme d'une fille morte probablement pendant le travail, qui avait été assez long mais n'avait nécessité aucune intervention.

Pas de traces de syphilis.

Les cuisses sont un peu arquées ; pas d'autre signe extérieur de rachitisme.

L'exploration du bassin montre qu'il est un peu aplati ; le diamètre promonto-sous-pubien mesure 10 cent. 7.

Le nouveau-né est un garçon pesant 3,040 grammes, bien conformé.

Aussitôt après l'accouchement, l'enfant une fois nettoyé, on remarque une déviation de son visage très nette quand il crie. On peut constater une paralysie faciale complète du côté gauche. L'œil gauche reste ouvert et les traits sont tirés à droite.

Pas de déviation apparente de la langue et de la luette.

La sensibilité paraît conservée.

Légère déformation de la tête ; bosse pariétale droite repoussée en arrière ; bosse séro-sanguine un peu étendue.

A gauche, petite traînée rougeâtre sur la peau de la tempe et dirigée de haut en bas et un peu d'arrière en avant.

Les diamètres de la tête sont :