

72. Ichneumon changeant. *Ichneumon versabilis*, Cress.

Trans. Am. Ent. Soc. vi, p. 161, ♂.

♂—Long. .46 pce. Noir ; la face, les orbites antérieurs, le scape en dessous, le collier au milieu, les écailles alaires, une ligne en avant, une autre au dessous, l'écusson, les 4 jambes antérieures avec l'extrémité de leurs cuisses, la base des jambes postérieures avec les segments 2 et 3 de l'abdomen, d'un jaune plus ou moins roussâtre. Antennes métacées, assez courtes, plus ou moins rousses en dessous. Métathorax rugueux, l'aréole centrale large, arrondie en avant. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures et le stigma jaunes. Hanches noires, les pattes postérieures noires, avec le tiers basilaire des jambes et un anneau à la base de chaque article des tarsi, jaune. Abdomen finement ponctué, poli à l'extrémité, les segments 2 et 3 jaunes variés de ferrugineux ou de brun à la base et au sommet, quelquefois aussi au milieu, les gastrocelles grands et profonds.—C.

Cette espèce est très variable dans sa coloration ; elle est très rapprochée du *comes*, ayant cependant l'abdomen bien plus finement ponctué.

73. Ichneumon généreux. *Ichneumon munificus*, Cress.

Trans. Am. Ent. Soc. vi, p. 162, ♂ ; *Ich. nobilis*, Cress. (nec Wesm.) Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 155, ♂

♂—Long. .64 pce. Noir ; la face, des lignes orbitales complètes, le scape en dessous, les écailles alaires, une tache en avant, une petite ligne au dessous, les bords supérieurs et inférieurs du prothorax, une tache sur les flancs, deux petites lignes sur le dos du mésothorax, les écussons, tout le sommet du métathorax, les 4 pattes antérieures avec leurs hanches et leurs trochantins excepté une tache sur les cuisses en dehors, les segments abdominaux 1, 2, 3 et 4 excepté à la base, jaune. Les pattes postérieures, toutes les hanches, les cuisses avec l'extrémité des jambes, noir. Ailes hyalines, jaunâtres à la base et légèrement enfumées à l'extrémité, le stigma jaune. Abdomen allongé, les derniers segments souvent marginés de roussâtre, le 2e fortement ponctué à la base, les gastrocelles grands et profonds.—C.

Se distingue surtout du *letus*, par sa plus forte taille. La tache du métathorax manque quelquefois.

74. Ichneumon inconstant. *Ichneumon inconstans*, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil., iii, p. 153, ♂.

♂—Long. .57 pce. Noir ; la face, le vertex en partie, le scape en dessous, les écailles alaires, une ligne en avant, une autre au dessous, l'écusson, le post-écusson, une tache sur chaque côté du méta-