

E. et C. C'est avec le Duc de Virginie le plus commun de nos hiboux. Voir pour ses mœurs notre article sur nos hiboux, page 197.

6 Gen NYCTALE, Brehm.

Taille petite; aigrettes auriculaires visibles seulement lorsqu'elles sont dressées; yeux petits; bec moyen et assez faible; disque facial presque parfait; ailes un peu longues; queue courte, jambes et doigts densément emplumés.

Ce genre renferme trois espèces dans notre faune.

1. **La Nyctale de Richardson.** *Nyctale Richardsonii*, Bonap. *Strix Tengmalmi*, Gm.—Angl. *The Sparrow Owl*.—Longueur 10–10½ pouces; ailes 7–7½; queue 4–4½. Bec jaune-clair; iris jaune; parties supérieures brun-rougeâtre, teint d'olive, avec taches blanches en parties cachées; face blanche avec une tache noire au devant des yeux; gorge avec raies brunes; parties inférieures blanc-cendré, avec raies longitudinales rougeâtres; jambes et doigts presque blancs souvent tachetés de brun; rémiges brunes avec taches blanches; queue brune avec environ 10 paires de taches blanches.

A. et R. C'est la plus grande espèce de nos chouettes (nyctales). Niche dans les conifères; pond 2 œufs blancs dans le cours de Mai.

2. **La Nyctale d'Acadie.** *Nyctale Acadica*, Bonap. *Strix Acadica*, Gm. *Strix passerina*, Linn.—Vulg. *Chouette passerine*; Angl. *The Saw-Whet Owl*; *Acadian Owl*.—Longueur 7–7½ pouces; ailes 5–5½; queue 2½–3. Bec et ongles bruns; iris jaune; parties supérieures brun-rougeâtre, teint d'olivé; tête avec cinq lignes blanches au front, et de nombreuses taches de la même couleur, mais en partie cachées, sur l'occiput, les épaules et le croupion; face blanc-cendré; gorge blanche; parties inférieures blanc-cendré avec raies longitudinales brun-rougeâtre pâle; rémiges brunes avec taches blanches, plus grandes sur le bord interne; queue brune, avec taches blanches, blanche en dessous.

E. et A. C. Niche dans les arbres creux, les trous des rochers, les vieux nids des pics &c.; pond de 3 à 5 œufs d'un blanc brillant.

3. **La Nyctale à front blanc.** *Nyctale albifrons*, Baird.—Vulg. *Chevêche de Kirtland*; Angl. *Kirtland's Owl*.—A peu près de la taille de la précédente, et s'en distingue particulièrement par sa poitrine fauve, le blanc qui domine sur son front, et les barres blanches de ses ailes.

E. et R. R. Ce n'est qu'accidentellement qu'on la rencontre à Québec. En 1863, Mr. Lemoine en a pris une vivante à Québec; elle fait partie de sa riche collection.