

## TUBERCULEUX MORTS.

Père et mère tuberculeux	Père tuberculeux.	Mère tuberculeuse.	Père et mère non tuberculeux.	Total.	Moyenne d'hérédité tuberculeuse.	Tub. aiguë.	Tub. chronique.
0	5	2	22	29	25%	13	10

Sur les 19 malades morts de tuberculose aiguë, 17 avaient des parents indemnes de tuberculose, et sur les 10, morts de tuberculose chronique, 7 avaient des parents sains.

Mes chiffres ne prouvent guère autre chose que les malades issus de parents tuberculeux meurent dans une proportion un peu plus forte que ceux issus de parents sains, et qu'ils font, comme les autres, une tuberculose aiguë ou chronique.

Le jour où la population comprendra bien que la tuberculose est une maladie communicable, par conséquent évitable, et guérissable, nous serons écoutés plus volontiers par des malades qui viendront nous voir dès le début de leur maladie.

Que le tuberculeux se rende bien compte qu'il a pris sa maladie au contact de tuberculeux ou plutôt au contact de crachats de ces tuberculeux, et aussitôt il cessera de cracher partout, et la tuberculose diminuera considérablement.

J'ajoute un mot sur le diagnostic et le pronostic de la tuberculose.

## DIAGNOSTIC.

La majorité des malades qui nous arrivent sont déjà porteurs de lésions assez marquées pour que le diagnostic ne fasse plus doute. Cependant, un bon nombre viennent nous consulter: qui, pour de la faiblesse progressive; qui pour de l'amaigrissement avec perte d'appétit, de digestion mauvaise, etc., qui pour un léger rhume qui persiste malgré le traitement usuel.

Il n'est pas toujours facile de dépister sûrement une tuberculose commençante. La chose est pourtant bien importante, et je crois que le médecin doit se donner beaucoup de mal auprès de ces malades douteux.

D'habitude une pression artérielle faible au-dessous de 15<sup>c</sup> au