

infectieuses chroniques. Enfin si la comparaison des modifications de la surrénale avec l'état du foie et des reins montre qu'il n'y a aucun parallélisme entre les lésions de la surrénale et celles du foie, au contraire, est-on autorisé à dire que les néphrites chroniques s'accompagnent plus volontiers de l'hyperplasie des surrénales; cependant il est certain que la surrénalite hyperplasique simple ou nodulaire, ou même adénomateuse peut exister en dehors de toute altération chronique du rein (7 observations sur 40). Par conséquent, la néphrite chronique et l'hyperplasie des surrénales évoluent souvent ensemble, parallèlement; mais il n'en est pas moins vrai que ces deux lésions peuvent être nettement indépendantes l'une de l'autre.

Z. RHÉAUME.

CONGRES DE QUEBEC

20-23 juillet 1908.

L'organisation a été parfaite au point de vue du fonctionnement intime du Congrès. Nous en félicitons M. le Dr Dussault et ses amis, MM. Leclere, Vallée, Nadeau et autres.

Le côté scientifique a été bon. Mais l'assistance n'a pas été aussi nombreuse qu'on l'aurait désiré. Nos confrères grisés de plaisir plus que de science à cause de ces airs de fête qui emplissent l'air ne faisaient que de courtes apparitions. Seule la section de médecine a montré quelque entrain le mercredi matin. Comme nous l'avons déjà écrit, ici, les congrès scientifiques ne doivent plus se réunir dans ces circonstances. Nous en causerons plus longuement dans le prochain numéro. Il y a eu à peu près 300 inscriptions.
