

II. — Mettre l'huile de ricin dans une tasse avec du lait chaud, sucré et aromatisé à la fleur d'oranger. Battre comme on ferait d'une mayonnaise et boire chaud avant la remontée des globules graisseux. La saveur désagréable de l'huile est parfaitement masquée.

III. — Liebreich recommande le procédé suivant : dans un verre, on mélange l'huile avec une certaine quantité de sirop de fruit ou de sirop de chocolat; on ajoute de l'eau de Seltz sous assez forte pression. On agite la masse que le malade doit absorber avant complet dégagement du gaz.

IV. — Voici une recette à la bière: Prendre un verre ordinaire et le remplir à moitié avec de la bière. Verser avec précaution la dose nécessaire d'huile, de manière qu'elle surnage le premier liquide.

Battre, d'autre part, une petite quantité de bière en mousse et déposer celle-ci sur l'huile de ricin.

Non seulement l'absorption se fait ainsi sans que l'on perçoive le goût d'huile, mais le médicament est bien toléré, les "renvois", s'il s'en produit, n'ayant absolument que le goût de bière.

On peut ainsi administrer l'huile de ricin à l'insu des malades, et nombreux sont ceux qui ont cru ainsi être purgés par une préparation qu'on leur disait être de la "bière à la magnésie".

V. — Le professeur Bondet, de Lyon, donne couramment l'huile de ricin sous la forme suivante, comme laxatif, et affirme que les malades le prennent "par plaisir" :

Huile de ricin.	} aa 20 gr.
Sirop d'orgeat.	
Eau de menthe.	

VI. — Voici des formules d'émulsions qui donnent toute satisfaction:

Huile de ricin.	2 à 10 gr.
Jaune d'œuf.	No 1

Battre vivement et ajouter peu à peu:

Eau tiède.	80 cent. c.
Eau de fleurs d'oranger.	20 —

A prendre en une ou deux fois. Préparation recommandée chez les enfants.