à l'hôpital Baudelocque, il y a quelques années. C'était alors la coutume de donner aux femmes en travail quelques onces de la potion alcoolique de Todd. Un jour, les médecins de cette maternité se demandaient s'il ne passait pas de l'alcool de la mère à l'enfant. On fit l'analyse du sang de l'enfant, et l'on y trouva en effet de l'alcool en nature.

C'est une vérité de la Palisse que l'ivresse des parents est particulièrement dangereuse pour les enfants, au moment de la procréation. A ceux qui auraient quelque doute sur cette vérité, je rappellerai le témoignage de Nicloux. Dans sa thèse sur la "Détermination de l'alcoolisme", Nicloux a en effet démontré que l'alcool peut pénétrer tous les tissus glandulaires, tous les produits de sécrétion, et que sa présence peut être révélée dans le sperme et l'ovule. On comprend alors que sous l'action de ce poison le sperme et l'ovule soient entravés dans leur fonction de fécondation et d'ovulation. Le système nerveux, qui se forme tout le premier dans l'organisme, aura à souffrir plus directement encore que tous les autres appareils de l'insuffisance des premières cellules; et c'est ainsi que s'explique, à notre avis, l'action des poisons sur le développement du fœtus, la possibilité de constater chez le rejeton un retard simple vraiment essentiel avec toutes les conséquences que celui-ci pourra avoir, débilité motrice, débilité mentale, hystérie, et, au dernier plan du tableau clinique: démence neuro-épithéliale.

5° Intoxications et infections. — La misère sociale et la misère physiologiques des parents sont aussi des cause de retard de développement. L'action dystrophiante du paludisme est aussi bien connue; on a vu certains enfants hérédo-paludiques atteints de dystrophie et de retard de développement. L'intoxication saturnine des parents, et le brightisme de la mère sont des causes importantes de retard dans le développement de l'enfant. Enfin il y aura lieu de se demander si une infection, une intoxication, un