Dans un cas d'hygroma du genou, M. le professeur Brosseau institue, avec succès, le traitement suivant: Ponction suivie d'injection à la teinture d'iode iodurée, et compression avec bandage élastique.

M. le professeur Brosseau fait observer que l'exostose sousunguéale survient dans l'adolescence, et de préférence chez les jeunes filles. Il pratique l'anesthésie locale au moyen de l'éther et enlève l'excroissance avec des cisailles.

Dans un cas de rhumatisme mono-articulaire, M. le professeur Laramée institue le traitement suivant: Cataplasme de Trousseau sur l'articulation malade; à l'intérieur, iodure de potassium et anodins (surtout l'opium et la morphine sous forme de suppositoires).

Il semble exister un rapport intime entre les affections granuleuses de la conjonctive et celles de la muqueuse pharyngienne. D'un autre côté, les sujets atteints de punaisie présentent souvent des traces d'anciennes granulations, de selérose, de trichiasis et d'entropion. (Prof. Foucher.

A propos d'un cas de rhumatisme articulaire aigu survenu chez une jeune fille, la maladie affectant les articulations coxo-fémorales, M. le professeur Laramée attire l'attention des élèves sur la rareté relative des cas de ce genre. Le rhumatisme articulaire n'affecte l'articulation coxo-fémorale qu'exceptionnellement chez les jeunes sujets; c'est chez les vieillards que se rencontre le plus souvent cette localisation.

Administré avec prudence, et par quelqu'un qui en fait son affaire exclusive sans s'accuper des détails de l'opération en voie de se faire, le chloroforme est aussi sûr que n'importe quel anesthésique. Un accident imprévu peut toujours survenir, il est vrai, mais on peut en dire autant de l'éther, du bromure d'éthyle, etc. Il est absolument nécessaire que le chloroforme soit pur. (Prof. Desnosiers).