

Faites dissoudre.

On imbibé de la charpie avec cette solution, et on s'en sert pour panser le sein cancéreux. Ce pansement déterge la plaie et retarde les progrès de l'ulcération.—N. G.—*Mouvement Médical*.

—
ACIDE PHÉNIQUE DANS LE DIABÈTE.—Le *Medical Record* traduit un mémoire d'Ebstein et Muller sur le traitement du diabète sucré par l'acide phénique qui paraît avoir entre leurs mains donné quelques bons résultats. Ils administrent la substance de la façon suivante en une potion :

Acide phénique cristallisé.....	1 grammé. (grxv)
Eau distillée.....	250 — (3viii)
Eau de menthe.....	50 — (3iss)

Cette potion est prise en trois jours, de telle sorte que le malade ait à prendre six ou sept cuillerées par jour. Le traitement est continué jusqu'à ce que 7 ou 8 grammes d'acide phénique aient été absorbés. On l'interrompt pour y revenir. Il ne faut du reste pas se priver du bénéfice d'autres moyens et en particulier de la diète animale. On a déjà obtenu des succès analogues par l'administration de la créosote.—*Journal de M. et de C. P.*

—
FISTULE A L'ANUS TRAITÉE PAR LA LIGATURE ÉLASTIQUE.—Le *Philadelphia medical Times* rapporte une observation de fistule à l'anus, traitée par le docteur Shell, par la ligature élastique.

Un fil de caoutchouc fin recouvert de soie, ayant été introduit, fut lié au dehors de l'anus. Le malade ne cessa de se lever chaque jour, souffrant fort peu. Le quatrième jour la ligature tomba laissant une plaie granuleuse. On fait ainsi l'opération sans douleur, sans hémorrhagie, sans repos au lit, sans que l'on soit obligé de rien prescrire pour modifier l'état des intestins. Il est très nécessaire de prendre garde que le fil de caoutchouc enveloppé de soie soit de bonne qualité, non cassant. En vieillissant il devient mauvais (*Medical Record*). Nous avons déjà insisté sur l'importance de la ligature pour cette petite opération. Il est d'autant plus intéressant d'y revenir, que, malgré des essais sérieux, la ligature élastique n'a pas été accueillie en France avec beaucoup de faveur. On a conseillé l'application d'un suppositoire morphiné pour le cas où il surviendrait de la douleur.—*Journal de Médecine*.

—
L'HYDRATE DE CHLORAL DANS L'INCONTINENCE NOCTURNE D'URINE, par le Dr. VECCHIETTI EDOARDO.—L'auteur rapporte cinq observations d'incontinence de l'urine chez des enfants de six à douze ans, guérie par 50 centigrammes d'hydrate de chloral pris en une seule fois, le soir avant de se coucher et continués pendant plusieurs soirs. Il pense que l'incontinence nocturne idiopathique dépendant