

Plus tard on fait des lotions excitantes avec :

Ammoniaque	5 grammes.
Essences de thérébentine	25 grammes.
Alcool camphré	125 grammes.

Où bien :

Acide ascétique	1 à 5 grammes.
Chloral	5 grammes.
Ether	25 grammes.

POUDRE A PRISER CONTRE LE CORYZA.

I. Menthol	0 gr. 20 centigrammes.
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 40 centigrammes.
Acide borique	8 grammes.
Salicylate de Bismuth	16 grammes.
II. Salol	2 grammes.
Benjoin	4 grammes.
Acide citrique	4 grammes.
Sucre de lait	10 grammes.

POMMADE GUYON.

Sublimé	0 gr. 02 centigrammes.
Eau	25 grammes.
Savon pulvérisé	50 grammes.
Glycerine	25 grammes.

Pour lubrifier les instruments de chirurgie : sondes urétrales, catheters elle est glissante, antiseptique et non irritante.

CONTRE L'APYREXIE.

Persulfate de soude	2 grammes.
Eau	300 grammes.

Une cuillerée à soupe une demi-heure avant les deux principaux repas.

Cessez au bout de six jours, même si on a obtenu un effet favorable. On recommence après une période de repos suffisante. En cas d'insuccès, cessez également.

D'autres malades se trouvent mieux de la solution suivante :

Métavanadate de soude	0g. 03 centigrammes
Eau distillée	150 grammes.

Une cuillerée à café durant quatre jours consécutivement une demi-heure avant les deux principaux repas. (Robin).