

DES ÉMOTIONS VIVES CHEZ LA FEMME ENCEINTE, COMME CAUSE DE LA MONSTRUOSITÉ

J'ai appris, par hasard, que certains confrères m'attribuaient la paternité de l'article paru sous ce titre dans le numéro de novembre de "La Clinique", et qu'ils étaient, à juste titre étonnés, pour ne pas dire plus, que j'aie déjà rencontré tant d'exemples de ces cas rares dans ma pratique encore jeune.

Je tiens à les désabuser. N'ayant pas encore trente ans, je ne saurais avoir à mon crédit une expérience de quarante années et plus.

Non, qu'on se rassure, je ne suis pas le père, mais bien tout au plus frère aîné de cet article, dont mon père est l'auteur.

ADELSTAN DE MARTIGNY.

Nous lisons dans le "St-Louis Medical and Surgical" qu'à une récente assemblée du congrès pénitencier international, la discussion a porté sur le meilleur moyen de protéger la société contre les criminels irresponsables, ou ceux qui ont été reconnus mentalement irresponsables de leur crime, au moment où il a été commis. Après discussion, les résolutions suivantes ont été adoptées : 1o. Des asiles spéciaux ou un département spécial, dans un asile d'aliénés, devaient être construits, pour y incarcérer les criminels qui ont été acquittés, ou dont la sentence a été suspendue par la cour, en raison du dérangement de leurs facultés mentales ; 2o. Ces irresponsables ne peuvent être libérés que par l'autorité judiciaire administrative, sur recommandation de l'autorité médicale.

D'après le recensement des Etats-Unis d'Amérique, sur chaque 10,000 la mort serait causée une fois par les calculs, 35 fois par l'albuminurie, 40 fois par les fièvres, autres que les fièvres typhoïdes, 59 fois par le rhumatisme, 70 fois par la scrofule, 130 fois par le cancer, 149 fois par l'apoplexie, 148 fois par la coqueluche, 160 fois par la dyssentérie, 190 fois par la méningite, 220 fois par la scarlatine, 246 fois par les fièvres intermittentes, 250 fois par les convulsions, 310 par les fièvres typhoïdes, 250 fois par les maladies de cœur, 480 par la diphtérie, 880 par la diarrhée, et 1420 fois par la phthisie pulmonaire. Sur ce nombre 2210 sont dues à la phthisie pulmonaire, aux fièvres typhoïdes et à la diphtérie, que l'on peut prévenir par l'hygiène, et si l'on ajoute à ces maladies, la coqueluche, la dyssentérie, la scarlatine et la diarrhée, nous verrons qu'au-delà du tiers des morts pourraient être prévenues par des mesures sanitaires.

(" Canadian Practitioner ")

On admet maintenant les femmes aux facultés de Médecine et de pharmacie de Buda-Pest. Elles ont aussi le droit de prendre leurs diplômes et de pratiquer la médecine et de tenir pharmacie,