

la malade en état de retourner chez elle. L'accouchement se fit à terme dans d'excellentes conditions. Il est évident que la rapidité, la gravité de l'hémorrhagie donnent au diagnostic de la cause une très grande importance ; mais il suffira de songer à la possibilité d'une rupture variqueuse de la vulve pour sauver la malade : car il sera, en général, assez facile par un examen attentif des organes génitaux externes, de découvrir la solution de continuité.

Donc quand on sera en présence d'une femme perdant du sang par en bas, comme elles disent, il faut examiner la vulve avant tout, cette simple inspection établira du premier coup un diagnostic qui pourrait sans cela rester hésitant et même impossible.

Il faut toujours, en présence d'une perte de sang par les organes génitaux, sans cause apparente, examiner la vulve et l'on arrêtera ainsi facilement des hémorrhagies rapidement mortelles.

PRONOSTIC

Pour la mère, il est d'une extrême gravité, sur neuf cas de ruptures de varices vulvaires, Budin a compté sept morts. Sur 18 observations, Varnier a compté que 11 fois l'hémorrhagie a été mortelle. Depuis, l'attention des médecins étant attirée sur la possibilité de cet accident, la gravité du pronostic est un peu atténuée, tout dépend du diagnostic, s'il est fait, l'accident est insignifiant, sinon il est le plus souvent et forcément mortel.

RUPTURE DES VARICES PENDANT L'ACCOUCHEMENT

Il peut se produire au moment du travail des déchirures variqueuses amenant l'hémorrhagie ; elles ont lieu pendant l'expulsion. Pendant le travail, elles peuvent être occasionnées par toutes les causes que nous avons passées en revue dans le paragraphe précédent.

OBSERVATION VI (TARNIER)

Marguerite R..... 22 ans, présentation du sommet en O. I. G. A. il s'écoule une certaine quantité de sang par la vulve, le côté droit de l'enfant sort couvert de sang. On pense à une hémorrhagie clitoridienne ; après l'expulsion de l'enfant le sang continue de couler abondamment ; il venait de la branche droite du clitoris, on fit des lavages à l'eau froide, l'écoulement diminua puis on fit de la compression et le sang cessa de couler.

Le diagnostic de l'hémorrhagie consécutive à la rupture de varices vulvaires pendant le travail sera mieux fait que pendant la grossesse, car le médecin examine les organes génitaux externes pendant le travail, de plus, l'attention sera attirée sur cette complication quand on aura remarqué sur les grandes ou petites lèvres des ectasies veineuses.