

*Nerita canrena*. Linn. — *Lister*, tab. 560. fig. 4. *Gualt.* tab. 67. fig. V. *Adanson*, pl. 13. fig. 2. *Dargenv.* pl. 7. fig. A. *Chemnitz*, Conch. 5. tab. 186. fig. 1860 et 1861.

Voyez pl. 28, fig. 5 et 6, où elle est représentée, en dessus et en dessous, un peu plus petite que nature.

Se trouve dans les mers de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique; et varie depuis le blanc jusqu'au bleu le plus foncé, avec des taches et des lignes de toutes couleurs.

#### Natrice treillissée, *Natica cancellata*.

Striée en sautoir avec des points enfoncés; spire un peu en massue, et ombilic à apophyse gibbeuse et bifide.

*Chemnitz*, Conch. 5. tab. 188. fig. 1911. 1914.

Se trouve sur la côte ouest de l'Amérique.

#### Natrice grelot, *Natica glaucina*.

Unie, la spire obtuse, l'ombilic à demi-fermé; la lèvre bossue, bicolore.

*Nerita glaucina*. Linn. — *Lister*, tab. 562. fig. 9. *Gualt.* tab. 67. fig. A. B. D. *Dargenv.* pl. 7. fig. V. *Chemn.* Conch. 5. tab. 186. fig. 1856. 1859.

Se trouve dans la mer de l'Inde et dans la Méditerranée.