

0 gr. 25 d'iodure par cuillerée. En donner une cuillerée à soupe.

Toutes les fois où vous soupçonnez la tuberculose, instituez une médication appropriée, cure d'air, viande crue, huile de foie de morue.

— Si, après le traitement, il persiste encore quelque chose du côté de la plèvre, recommandez la gymnastique respiratoire. Cette gymnastique est tout ce qu'il y a de plus simple. Lorsque le malade fait coup sur coup 3 ou 4 inspirations assez fortes par le nez, on voit le côté sain s'élargir plus que le côté de la pleurésie. Eh bien! appliquez la main sur la partie supérieure et inférieure du thorax, côté sain, et dites au patient de faire un effort respiratoire, renouvelez 4, 5, 6 fois. Il peut répéter lui-même cette manœuvre plusieurs fois dans la journée. Y joindre un massage très doux pour tonifier les muscles interscostaux.

Dans le cas où, malgré tout, il resterait des résidus pleurétiques, vous conseilleriez une cure thermale, à Cauterets, à Allevard, ou au Mont-Dore s'il y a une toux sèche, quinteuse, se produisant au passage du froid ou chaud.

—————o:—:o—————

SUR UNE NOUVELLE FORMULE DE POMMADE.

C'est un glycérolé sans amidon, obtenu simplement par le mélange à chaud de la glycérine avec les produits utiles de la pommade.

Dans une capsule de porcelaine chauffée au bain d'huile à 125 degrés environ on fait fondre ensemble:

Antipyrine	188 grammes.
Resorcine	110 —
Terpine	180 —