

I—Près de Belledune:—

1. Au pied du barrage de la rivière Hendrey à 70 pieds au-dessous du chemin.
Palæocyclus rotuloïdes, Hall.
 Anneaux de crinoïdes.
2. Sur la grève à 400 pieds à l'est de la rivière Hendrey. Trois échantillons d'un corail cyathophylloïde trop mal conservé pour identification.
Halsites catenularia, L.: morceaux.
 Anneaux de tiges de crinoïdes.
3. Sur la rivière Hendrey à 40 pieds plus haut que le pont.
Cyathophyllum, cfr. *thoroldense*, Lambe.
Aulopora, sp., petits fragments.
Syringopora dalmani, Billings; fragments.
Favosites gothlandica, Lamarck.
Cladopora multipora, Hall; fragments.
 ? *Monticulipora*; zoaria, petits morceaux de zoaria mal conservés.
Dalmanella elegantula (Dalman); non formé.
4. 475 pieds à l'est de l'embouchure de la rivière Hendrey
Streptelasma bilateralis (Hall)
5. Rivière Hendrey, 90 pieds plus haut que le grand chemin.
Favosites gothlandica, Lamarck.
6. Sur la grève à 650 pieds à l'est de la rivière Hendrey
Palæocyclus rotuloïdes, Hall;
 Un échantillon montrant seulement la base.
Cyathophyllum thoroldense ? Lambe.
7. Rivière Hendrey, 105 pieds plus bas que le pont.
 Parties de tige de crinoïdes.
Anoplothecca hemispherica (Sowerby); valves dorsales.
8. Rivière Hendrey 130 pieds plus bas que le pont.
Syringopora dalmani, Billings.
Favosites gothlandica, Lamarck.
 Corail favositoïde (? *Favosites niagarensis*, Hall).
 Parties de troncs de crinoïdes.
9. Rivière Hendrey en haut du pont.
 Fragments de corail rugosa. ? *Streptelasma*.
 ? *Dalmanella elegantula* (Dalman); mal conservé.