

Antipyrine	0 gr. 50
Bicarbonate de soude	0 gr. 25
Citrate de caféine	0 gr. 10
Sulfate de spartéine	0 gr. 02

Deux à quatre cachets.

Antipyrine	0 gr. 50
Bicarbonate de soude	0 gr. 25
Chlorhydrate de quinine	0 gr. 10
Valérianaie de caféine	0 gr. 02

Deux à trois cachets.

L'emploi du salicylate de soude à haute dose.

Le docteur Ed. Crouzet préconise dans le *Répertoire de pharmacie* (n° 7, 10 juillet 1911) la solution concentrée lacto-gommeuse en injections ano-rectales, comme moyen de choix pour administrer le salicylate de soude dans les formes aiguës du rhumatisme et lorsque l'intolérance de l'estomac empêche d'utiliser la voie gastrique.

"Voici la formule de cette solution concentrée:

Salicylate de soude cristallisée	16 grammes.
Gomme arabique pulvérisée	4 —
Lait bouilli	Q. S. pour 120 c. c.

Chaque cuillerée à soupe de cette solution représente donc 2 grammes de salicylate de soude, à employer *ad libitum*, et, selon le cas, avec une seringue en verre ou une poire en caoutchouc. La muqueuse rectale supporte très bien d'habitude le contact de cette solution édulcorée par la gomme et par le lait.

Cette solution se conserve facilement pendant plusieurs jours par toutes les températures, grâce aux propriétés antiseptiques du salicylate de soude lui-même."

Sirop expectorant.

Acétate d'ammoniaque	5 grammes.
Sirop d'ipéca	
— de polygala	} 15. 30 grammes.
— de rhubarbe	
— de tolu	

Une cuillerée à bouche toutes les trois heures.

H. SAINGERY.