

Les stimulants diffusibles sont préférables aux vomitifs :

Julep gommeux	} â â.....	1½ once
Sirop de tolu		
Cognac.....	2 à	3 drachmes
Acétate d'ammoniaque.....	20	grains
Benzoate de soude.....	8	grains

Sig.—Par cuillerées à dessert toutes les heures ou toutes les deux heures suivant l'âge de l'enfant.

(b) *Par la révulsion.*—Bains sinapisés de cinq minutes environ. Il ne faut employer les vésicatoires que *tout à fait à la fin de la maladie et jamais au début.*

Lorsque l'on constate des phénomènes hyperhémiques intenses qui se traduisent à l'auscultation par une grande quantité de râles envahissant tout le poumon, le camphre rendra de grands services :

Acide benzoïque.....	2	grains
Camphre en poudre.....	½	grain

Pour un paquet dans du lait.

On peut aussi employer les injections d'huile camphrée à 1/10 ; un quart de seringue pour un enfant d'un an.

III.—*Combattre l'asthémie cardiaque.*

Ajouter à la potion conseillée plus haut (Julep gommeux, etc.) cinq gouttes de teinture de digitale. Injections sous-cutanées de caféine.

IV.—*Combattre l'intoxication générale.*

Deux cas peuvent se présenter.

Où les phénomènes d'empoisonnement coïncident avec des lésions pulmonaires très étendues ; dans ce cas la lutte sera désespérée. Vous mettrez en jeu le traitement général de bronchopneumonie, mais probablement sans succès.

Où bien, les phénomènes d'intoxication générale tout en étant très marqués, on ne constatera que des foyers pulmonaires limités ; ici, le meilleur agent thérapeutique sera les bains froids. Il faut les donner toutes les trois heures jour et nuit, leur température doit être de 20° centigrade, la durée de 45 minutes environ ; si l'enfant est pris d'apnée, vous appliquerez le procédé de tractions rythmiques de la langue de M. Laborde. C'est dans ces conditions que les bains froids vous donneront des résultats remarquables et vous permettront de sauver des malades, même gravement compromis.