

service qui présente des phénomènes de ce genre. Je le pris d'abord pour un stimulateur, tellement il dépeignait vivement ses souffrances; un examen plus approfondi me montra que ses forces digestives étaient très atteintes, car il ne pouvait supporter que le lait et les œufs. De temps à autre, il avait des vomissements; la douleur rendait la palpation très difficile, cependant nous pûmes constater qu'il n'avait ni tumeur ni dilatation. Fils d'une femme nerveuse qui avait longtemps eues les mêmes douleurs, lui-même était très nerveux. Nous avons eu un autre malade qui souffrait de la même manière, avait le caractère très irritable, riait et pleurait sans motifs; il avait une sœur folle enfermée à l'asile de Vaucluse. En ville, j'ai vu plusieurs malades de ce genre, un, entre autres, que j'ai guéri de ses douleurs par le bicarbonate de soude, mais qui est devenu fou. Il avait un père hypochondriaque, une sœur aliénée, et, chez lui, la folie stomacale a été remplacée par la folie cérébrale.

J'ai encore donné mes soins à une jeune fille qui présentait l'anorexie hystérique de Lasègue et ne voulait pas manger à cause de ses douleurs: c'était la fille d'un fou.

Il y a donc des cas où, par suite d'une sorte de folie du pneumogastrique stomacal sans lésions de l'estomac, il y a exagération de sa sensibilité, d'où exagération de la quantité de suc gastrique sécrété, c'est-à-dire ce que j'appelle "polygastrie", cause de la "gastralgie".

PRONOSTIC DE LA NEPHRITE CHEZ LES ENFANTS

PAR M. LE PROFESSEUR GRANCHER

Le pronostic de la néphrite présente, chez les enfants, des différences si grandes qu'il est souvent extrêmement difficile de se prononcer sur l'évolution ultérieure de la maladie. Les faits suivants montrent les différences de formes que peut revêtir la maladie dans ces conditions.

Un enfant de 2 ans environ, bien portant, a été atteint, trois semaines avant son entrée à l'hôpital, de gonflement de la face et des membres, en même temps que les urines étaient épaisses et sanguinolentes. A son entrée, on constatait les mêmes symptômes, et les urines, épaisses et rougeâtres, contenaient une grande quantité d'albumine. Cet état se maintint quelques