

ptio mea l. c. data ad specimen male siccatum est concinnata. W.

*68. *FICUS scabra. W.*

F. foliis subrotundo-ellipticis dentatis acuminatis scaberrimis. Willd. Act. Acad. Berol. 798. p. 102. t. 2. Rauhblättrige Feige. W.

Habitat in Guinea. t. (v. f. f. fl.)

Rami teretes striati scabri a casu foliorum cicatrifati. Folia alterna petiolata subrotundo-elliptica basi attenuata integerrima, apice acuminata, margine inaequaliter dentata venosa, utrinque punctis prominulis scaberrima. W.

69. *FICUS maculata.*

F. foliis oblongis acuminatis basi attenuatis serratis, receptaculis globosis calyculatis maculatis sessilibus. W.

F. foliis oblongis acuminatis serratis. Sp. pl. 1515.

F. castaneae folio, fructu globofo maculato. Plum. spec. 21. ic. 131. f. 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 547.

Gesleckte Feige. W.

Habitat in St. Domingo. t.

*70. *FICUS ulmifolia.*

F. foliis ovatis inaequilateris dentatis acuminatis utrinque scabris. W.

*F. foliis ovatis rariter dentatis acuminatis basi et apice inaequalibus utrinque scabris. Lam. encycl. 2. p. 495. **

Rüsterblättrige Feige.

Habitat in Philippinis. t.

*71. *FICUS capensis.*

F. foliis ovato-oblongis acutis sinuato-dentatis glabris, receptaculis obovatis pedunculatis. W.

F. foliis ovatis acutis glabris serratis, fructibus pedunculatis glabris. Thunb. diff. de ficu. n. 23.

Capische Feige. W.

Habitat ad Cap. b. spei. t.

Arbor excelsa vasta glabra. Rami patentes. Folia ovato-oblonga acuta sinuato-dentata glabra, supra