

bicarbonate de soude avec un peu de brandy, 3 fois par jour, et cela tout le temps dans l'intervalle des crises, lesquelles du fait de ce traitement, dit-il, finirent par disparaître. Depuis le prescrivis par routine ce médicament, à la dose de 3 à 5 grains, suivant l'âge, 3 fois par jour avec un peu d'eau, et je m'en suis si bien trouvé, que je ne puis mieux faire que de le recommander à mes confrères.—A. J.

* * *

LA COLIQUE OMBELICALE.

Le Dr Stern, dans "Journal of the Medical Society of New-Jersey" (août 1920), appelle l'attention des médecins sur une forme spéciale d'hystérie, survenant chez les enfants de 3 à 10 ans, et décrite par Friedjung en 1904. Elle consiste dans des attaques subites de douleurs abdominales dans la région ombélicale. Ces attaques douloureuses sont habituellement soudaines et durent à peine 15 à 30 minutes. Elles surviennent à différents intervalles, et sur une période de plusieurs années, et ne s'accompagnent d'aucun trouble de l'estomac ni de l'intestin. Des signes d'ordre nerveux se rencontrent fréquemment chez ces sujets, tels que le fait de se ronger les ongles, l'hyperesthésie des vertèbres—cervicales et thoraciques, ainsi que de la peau de l'abdomen. Naturellement avant de poser un pareil diagnostic de nervosisme, il faut éliminer l'appendicite aiguë. Le Dr Stern considère cette maladie comme étant un trouble du système nerveux, et la classe parmi les manifestations hystériques.

* * *

NOTE DE DERMATOLOGIE

Linges stérilisés re prophylaxie et traitement des infections cutanées chez le nourrisson.

Le linge stérilisé prévient et guérit nombre de dermatoses des nourrissons, écrit le Dr Weill de Lyon dans "*La Médecine*" (Novembre 1921).

Dans une crèche hospitalière, infectée depuis plusieurs années, le Docteur, a constaté que les nourrissons habillés et lavés avec du linge simplement lessivé contractaient fréquemment des pyodermites, alors que d'autres soumis systématiquement au régime des linges stérilisés restaient constamment indemnes de toute infection cutanée.

Ce sont surtout les infections cutanées d'origine externe qui réclament l'emploi de linges stérilisés : érythèmes populo-érosifs des fesses et des cuisses, érythème du cuir chevelu, avec pustules et ulcérations occipitales, pyodermites pustuleuses, diffuses, abcès multiples de la peau.

Bien plus, les linges stérilisés donnent des résultats très supérieurs aux antiseptiques employés sous forme de bains, de lotion, de pommade ou de poudre. Ces substances, capables tout d'abord d'atténuer la virulence des germes infectieux, provoquent secondairement une macération ou une irritation des téguments créant ainsi un milieu favorable au développement microbien.