

Cette forme ataxique de l'affection typhoïde est aussi grave que la précédente et elle fait périr un grand nombre des enfants sur lesquels on l'observe.

Le traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants comporte trois indications :

- 1^o Nettoyer l'estomac des saburres ou sécrétions muqueuses altérées;
- 2^o Evacuer et neutraliser les matières putrides et bactériennes de l'intestin ;
- 3^o Modérer la fièvre et entretenir les forces.

PREMIÈRE INDICATION. — Lorsqu'au siècle dernier on désignait la fièvre typhoïde sous le nom de *fièvre putride*, la conception n'était pas mauvaise, et elle est justifiée par les recherches actuelles. C'est alors qu'on donnait les purgatifs, ce que beaucoup de médecins ont continué à faire aujourd'hui dans le but de nettoyer et de laver l'intestin des matières putrides qui s'y trouvent. Ces matières créent un milieu intérieur favorable à l'éclosion des *lombrics*, des *trichocéphales*, et j'ajouterais des *ptomaines* et *leucomaines* intestinales dont la résorption entraîne un état général plus ou moins grave.

La maladie qui commence crée le milieu où se développent les parasites, les microbes et les alcaloïdes dont l'effet doit être si funeste.

Que faire alors ? Empêcher la formation et le séjour des sécrétions gastro-intestinales.

Si le médecin fait un diagnostic rapide et peut traiter l'affection à son début, il peut *juguler* la maladie ou en *diminuer l'intensité*.

Comment arrive-t-on à ce but ? Par l'*émétique* ou l'*éméto-cathartique*. Il faut donner aux jeunes enfants de 4 à 10 ans :

Emétique, 25 milligrammes.

Eau sucrée, 60 grammes.

A prendre en une fois.

Et chez les enfants de 10 à 15 ans :

Emétique, 5 centigrammes.

Eau sucrée, 60 grammes.

A prendre en une fois.

Cette médication fait vomir et produit un abaissement momentané de la température fébrile de un à deux degrés, pendant 24 heures, puis la température remonte.

Ou bien on donne :

Emétique, 25 milligrammes.

Citrate de magnésie, 30 grammes.

Ce qui produit des vomissements et quelques garde-robes.

On a ainsi débarrassé l'estomac et l'intestin des sécrétions muqueuses où se forment les microbes et les leucomaines. Cela suffit souvent pour arrêter la maladie, et si elle continue, sa marche est très lente et sa gravité très atténuée.

Une nouvelle purgation à l'eau de Sedlitz ou de magnésie, 30 grammes vers le troisième jour du traitement, achève ce que l'émétique a commencé.

Tel est le traitement abortif de la fièvre putride ou typhoïde, prise à début. Mais si la maladie est lancée et qu'on la prenne au quatrième ou cinquième jour, il n'y a plus à compter sur cette médication pour un aussi bon résultat. La maladie suivra son cours et on ne doit plus com-