

TRAVAUX ORIGINAUX.

CLINIQUE MEDICALE

HÔPITAL NOTRE-DAME (Montréal).—M. LARAMEE

De la sclérose du rein.

(Leçon recueillie par Ls. Ph. NORMAND, M.D. assistant médecin interne.)

MESSIEURS,

Le malade que vous voyez ici souffre d'une affection que l'on rencontre assez souvent dans la pratique de la médecine; je veux parler de la maladie de Bright.

Cet homme est âgé de quarante ans et était maçon de son métier. Le 15 octobre dernier, il obtenait son admission à l'hôpital. A son arrivée, il se plaignait de dyspnée et de micturition fréquente datant de longtemps. A l'interrogatoire il nous déclare que, sauf ces accès d'oppression et ces troubles de l'urine, il avait toujours joui d'une assez bonne santé, bien qu'il eut fait un usage journalier des alcooliques pendant une vingtaine d'années. Il ajoute qu'il avait éprouvé une curieuse sensation dans les doigts. A l'analyse de l'urine faite séance tenante, on trouva une assez grande quantité d'albumine, et à l'examen microscopique la présence de cylindres épithéliaux fut nettement décelée.

Le malade n'avait jamais souffert d'œdème, cependant depuis son entrée ici, nous avons constaté un œdème passager aux membres inférieurs. Il n'a jamais accusé des douleurs lombaires.

L'examen ophthalmoscopique fait par M. le docteur Foucher ne démontra pas l'existence du trouble oculaire spécial à cette maladie: la rétinite albuminurique. Toutefois il est évident que ce malade souffre de maladie de Bright, affection dont je veux vous entretenir aujourd'hui.

Le mal de Bright se divise en deux catégories cliniquement bien différentes, à savoir: 1^o le mal de Bright aigu, dont la durée dépasse rarement quatre semaines, et 2^o le chronique d'emblée, dont je m'occuperai dans cette leçon, vu que c'est la forme la plus importante que nous ayons occasion de traiter.

Le mal de Bright, chronique d'emblée, se présente cliniquement et histologiquement sous trois formes principales qui sont, par ordre de fréquence:

- 1^o la forme parenchymateuse,
- 2^o la forme interstitielle,
- 3^o la forme amyloïde.

Je vous parlerai surtout de la deuxième forme ou forme interstitielle, qui est celle dont souffre le sujet de cette leçon, puis j'ajouterai quelques mots sur les deux autres formes, et je terminerai par quelques considérations sur le traitement.

La deuxième forme de la maladie de Bright est donc la néphrite inters-