

Quantité plutôt diminuée, environ 700 grs. dans les 24 heures. Peut-être l'abondance de ses diarrhées explique-t-elle ce phénomène.

Couleur jaune ambrée, aspect un peu trouble (avant filtration).

Dépôt blanchâtre assez abondant au repos.

Réaction faiblement acide. Densité, 10.20 environ.

Pas d'albumine, ni sucre, ni pigments biliaires.

Urée, 10 gr. au litre.

Pas de cylindres, ni épithéliums.

Le dépôt est en grande partie formé de cristaux, de carbonate de chaux, et le dosage de la chaux donne 364 milligr. au litre, ce qui représente le chiffre normal chez l'adulte.

EXAMEN DU SANG.

Deux examens de sang, provenant de la pulpe du doigt, ont donné, en moyenne :

Hématies	5288000
Hémoglobine.....	55/100
Leucocytes.....	32000

Deux examens de sang pris sur le bras, ont donné, en moyenne :

Hém.....	4216000
Hémog	55/000
Leucoc.....	31620

L'état congestif, la stase sanguine, observée au niveau de l'extrémité ligatale de notre malade, nous fournit l'explication de l'hyperglobulie que nous trouvons dans nos premiers examens. L'anémie est notable, et la leucocytose se caractérise surtout par la prédominance des polynucléaires. Voici du reste le pourcentage des diverses variétés de leucocytes :

	Moronucl.	Eosinoph.	Polynucléaires.
Télesph. V.....	4.89 p. c.	6.7 p. c.	88.4 p. c.
Normal (1).....	38.	1.5 à 2.	65.

(1) Joly, cours du collège de France.

MENSURATION.

TÉLESPHORE V., 11 ans.

<i>Membre supérieur :</i>	<i>Gauche.</i>	<i>Droit.</i>	<i>Gauche.</i>
	Enfant de 11 ans malade.		Enfant de 11 ans bien portant.
Médus, circonférence, 2e phalange.....	0.060	0.065	0.055
Main, circonférence (gant)	0.165	0.170	0.170
Poignet, circonférence.....	0.160	0.160	0.140
Avant-bras, circonférence, milieu de l'.....	0.155	0.155	0.175
Coude, circonférence.....	0.180	0.185	0.190
Humérus, circonférence, au-dessus du coude..	0.140	0.140	0.170
Main, longueur.....	0.140	0.140	0.160
Main, largeur.....	0.750	0.750	0.750
Cubitus, longueur.....	0.200	0.200	0.200
Humérus, longueur.....	0.265	0.265	