

3° *Forme adynamique.* — Bains sinapisés, sérum, acétate d'ammoniaque.

Acétate d'ammoniaque.....	0 gr. 50 par année d'âge
Liqueur éthérée d'Hoffman.....	V gouttes —
Sirop de sucre.....	20 gr.
Eau de fleurs d'oranger.....	100 gr.

4° *Forme hémorragique.* — Injections de 5 centimètres cubes de sérum gélatiné bien stérilisé, potion avec 0 gr. 10 par année d'âge de chlorure de calcium.

Convalescence. — L'enfant gardera le lit encore pendant 5 jours après la chute de la température, la chambre 8 jours ensuite, puis séjour au grand air.

Tonifier avec quinquina, arséniate de soude, etc.

II. SCARLATINE.

Maladie contagieuse, épidémique, confère l'immunité après une première attaque.

Signes cliniques. — *Période d'incubation* : 2 à 4 jours.

Invasion. — Fièvre, 39,5 à 41° dès le premier ou le second jour, céphalalgie, angine.

Eruption. — D'abord sur les fesses, puis tronc, avant-bras, ventre, face, se fait en 3 à 5 jours, grandes plaques rouges à fond parsemé d'un pointillé plus foncé. Langue framboisée. Angine rouge, puis pultacée, ganglions cervicaux.

Desquamation. — Se fait de la poitrine aux extrémités, par écailles au visage, par grandes squames sur le tronc, par plaques épidermiques aux membres, par lambeaux aux doigts. Durée, 10 à 20 jours.

Complications. — Néphrite, bubons scarlatineux; angine couenneuse, diphtérique; arthrites, pleurésie, péricardite, endocardite; otite.

Formes. — Légère, fruste, maligne, hémorragique.

TRAITEMENT:

Hygiène. — Chambre à la température de 16 à 18°, aérée souvent, le malade étant maintenu au lit.

Le malade doit garder la chambre 6 semaines (à cause de la