

fièvre typhoïde? Schneider, commissaire impérial allemand de la lutte systématique contre la fièvre typhoïde, estime, d'après les documents de ses laboratoires de prophylaxie, que sur 100 cas de dothiéntérie dont l'origine avait pu être établie avec certitude, 5 étaient dus au contact avec des porteurs de germes. Forster (de Strasbourg) porterait même ce chiffre à 20 ou 27 p. 100; mais cette dernière proportion nous semble un peu exagérée, attendu que, d'après Koch lui-même, les cas hydriques seraient de 77,4 p. 100, et les *cas non hydriques* de 21,7 p. 100 (soit 17 p. 100 pour le lait et 4,3 p. 100 pour le contact).

Le *danger* des "porteurs de bacilles" est donc *réel*: il ne faut pas qu'il échappe au prophylacticien recherchant l'étiologie du premier cas; mais, s'il revendique pour lui 5 p. 100 des cas de fièvre typhoïde, il ne doit cependant pas être exagéré, en ce sens que, pour se manifester, il exige le terrain propice, ou mieux l'état de *réceptivité* des individus exposés.

C'est ainsi que Minelli, dans une prison renfermant 250 détenus, a pu trouver, sans qu'il y ait de cas de fièvre typhoïde, un porteur de bacilles dont le sang agglutinait son propre bacille à 1 p. 10.000; et que, d'autre part, sans fièvre typhoïde également, W. Hamm a décelé le bacille d'Eberth dans le sang de 8 sujets sur 136 individus d'une maison de correction. 4 d'entre eux agglutinaient à 1/50, un autre à 1/100 et 3 à 1/200. A noter que, sur ces 8 sujets, 4 avaient eu la fièvre typhoïde de huit à douze ans auparavant, et que, chez les autres, il était impossible d'affirmer avec certitude une fièvre typhoïde antérieure.

La morbidité et la longévité chez les débitants de boisson, dans *Journal Méd. et Chir. prat.* nov. 09.

Déjà en 1880, une enquête faite en Angleterre par M. Nelson, montrait que de 25 à 65 ans, tandis que les cabaretiers mouraient dans une proportion de 24 décès pour 1000 vivants, la moyenne générale pour le même âge était de 15 p. 100.

Plus récemment, Latham a fait voir que:

Sur 100,000 habitants masculins meurent, toutes causes réunies:

| | Débitants | Autres boutiquiers. |
|----------------------|-----------|------------------------|
| De 25 à 35 ans | 1505.9 | 688 0 |
| De 35 à 45 ans..... | 2451.6 | 1114.0 |
| De 45 à 55 ans..... | 3524.2 | 1829.2 |
| De 55 à 65 ans..... | 5268.4 | 3291.2 |

Si, d'autre part, on considère que d'après le même travail il