

logie du cancer est encore mal connue, cependant on connaît mieux sa pathogénie.

Les symptômes varient beaucoup suivant le siège de cette lésion. C'est au pylore, puis au cardia que le cancer se rencontre le plus souvent. Les autres localisations sont comparativement rares. En dehors du rectum, de l'œsophage et de l'utérus, l'estomac est le plus riche en fibres lisses. Il a un mouvement constant et prolongé de ses fibres, au moins 6 heures sur 24 heures pour pousser son contenu dans l'intestin. Le pylore ralentissant la marche trop rapide des aliments plus ou moins bien digérés, est sujet à des tractions et des déplacements continuels ; de là une cause d'irritation locale.

Certains auteurs ont émis la théorie que la fréquence du cancer à l'orifice pylorique était due à une irritation locale et à l'appui de leur thèse ils ont démontrés qu'un corps étranger placé dans le vagin des rats donnait naissance à une tumeur cancéreuse de nature épithéliale. C'est surtout dans cette espèce que l'on observe des métastases.

Les métastases se font par voie sanguine, les radicules de la veine porte et la voie lymphatique transporte l'infection aux ganglions rétropéritonéaux, aux poumons, à la plèvre, au péricarde et au foie.

Les symptômes au début sont obscurs. L'anorexie est un des plus fréquents. Quelquefois elle fait complètement défaut. C'est une anorexie vraie, non comparable à celle de l'ulcère. Dans un cas d'ulcère, le patient ne mange pas par crainte des souffrances dues au contact des aliments avec la plaie gastrique. Dans le cancer il y a indifférence complète, le malade a un dégoût particulier pour telle ou telle substance et il préfère de beaucoup les mets épicés.

La douleur est un symptôme des plus importants. Cependant quelques cancéreux succombent sans avoir eu de douleurs. Le diagnostic se fait à l'autopsie. Le siège de la douleur varie beaucoup. Dans les cas de cancer du pylore, la douleur est ressentie à l'hypochondre gauche ou à l'épigastre. Si le cardia est affecté, la douleur sera à l'épaule gauche, à la petite courbure, et quelquefois entre les deux épaules. Si c'est au pylore nous aurons des vomissements qui arriveront deux ou trois heures après les repas, et dans ces vomissements