

GENTIANACEÆ. (*Juss*)**Pleurogyne rotata.** (*Griseb.*)**Gentiana sulcata.**—(*Willd.*)“ “ **rotata.**—(*Froel.*)VAR : **americana.**—(*Griseb.*)

Au Labrador, au Groënland, à Terre-neuve et en Islande.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

EMPETRACEÆ.**Empetrum nigrum.** (*Linn.*)

Cette plante se retrouve au Groënland, en Islande, en Laponie, en Russie, en Sibérie, dans le nord de l'Allemagne et sur le sommet le plus élevé des Alpes. Son fruit porte le nom vulgaire de “ graine de corbi-geaux ” (*Numenius hudsonicus*), parce qu'il est très-recherché de ces oiseaux.

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

Empetrum rubrum. (*Willd.*)

Cette plante se distingue, de la précédente surtout, par ses fruits rouges. Elle se retrouve à l'extrémité méridionale de l'Amérique, le long du détroit de Magellan, dans les sables. (*Duchartre, Manuel des Plantes.*)

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

BETULACEÆ.**Betula glandulosa.** (*Michx.*)“ **pumila.** (*Linn.*)

Petit arbre de six à huit pieds, mais qui est beaucoup plus petit au Labrador. L'échantillon dont il