

proportion mais leurs constituants sont nombreux que l'addition de leur unité nocive forme une somme de toxicité relativement considérable. La constipation est généralement la règle, car à l'irritation intestinale locale succède une vaso-constriction qui diminue les sécrétions des 40 à 50 millions de glandes de Lieberkühn. Il y a donc indication d'administrer de légers purgatifs chalagiques, nous donnons la capsule suivante le soir durant 3 ou 4 jours ou matin et soir au besoin :

Calomel- - - - -	16	milligrammes (1-4 grain)
Menthol- - - - -	8	" (1-8 grain)
Carbonate de gaiacol- -	10	" (1-6 grain)
Eucalyptol- - - - -	3	minimes.

M.

Les composés volatiles antiseptiques gaiacol, menthol, eucalyptol joignent leurs effets thérapeutiques à l'action du chloroforme.

Lorsqu'au début de la maladie, le typhique souffre de diarrhée la réaction défensive vaso-motrice ne s'est pas produite et cela indique ou une profonde intoxication ou une déchéance vitale du patient, c'est dans ces cas où la strychnine à dose 1 milligramme (1-60 de grain) à toutes les quatre heures donne d'excellents résultats quelque soit l'élévation de la température. La limonade à l'acide lactique complète le traitement interne :

Acide lactique- - - -	5	grammes (2 1-2 drachines)
Sirop de limon- - - -	60	" (2 onces)
Eau distillée- - - - -	1000	" (32 onces)

à boire par demi-verre dans la journée.

A l'extérieur comme dans les autres cas graves de fièvre typhoïde l'on fait matin et soir un badigeonnage de la fosse iliaque droite avec la solution suivante :

Gaiacol- - - - -	4	grammes (2 drachmes)
Iode- - - - -	11	" (3 drachmes)
Glycérine- - - - -	18	" (5 drachmes)

On recouvre la surface d'une gutta percha ou d'une soie huilée puis on immobilise l'intestin par une douce compression ouatée. Les malades qui suivent ce traitement ne présentent pas une température au-dessus de 39°C. (102°F.); aucune médication antipyrétique qui ralentit les échanges tels que : l'antipyrine, le pyramidon etc., ne doit être donné.