

Les Lébies sont de taille moyenne ou petite. On les trouve sous les écorces, sur les troncs d'arbres et sur les fleurs. La plupart sont ornées de couleurs très vives.

1. **Lébie à ventre noir.** *Lebia atriventris*, Say.—Longueur .30 pouce. Ferrugineuse. *Elytres d'un pourpre foncé*, élargies à l'angle postérieur externe. Stries sans ponctuations.—AR.

2. **Lébie tricolore.** *Lebia tricolor*, Say.—Longueur .35 pouce. Tête noire; bouche, antennes, thorax et pattes, ferrugineux; *élytres vertes, brillantes*. Ventre noirâtre.—C.

3. **Lébie verte.** *Lebia viridis*, Say.—Longueur .22 pouce. *D'un beau vert métallique brillant*; ventre noir. AC. Se trouve ordinairement sur les fleurs.

4. **Lébie petite.** *Lebia pumila*, DeJean.—Longueur .18 pouce. *D'un noir uniforme dans toutes ses parties*. Elytres courtes, tronquées carrément à l'extrémité.—AC. Se rencontre sur les fleurs.

5. **Lébie scapulaire.** *Lebia scapularis*, DeJean.—Longueur .28 pouce. Tête, prothorax et tout le dessous du corps roussâtres. Yeux noirs. Antennes brunâtres à l'extrémité. *Elytres noires, avec une bande longitudinale rousse sur le milieu de chacune*.—AC. Se rencontre sur les fleurs.

6. **Lébie fourchue.** *Lebia furcata*, Leconte.—Longueur .45 pouce. Tête, prothorax et dessous du corps rougeâtres. *Les yeux, les antennes et les pattes en partie, noirs*. Elytres jaunâtres, *avec 2 barres noires obliques sur chacune*, la 1^{ère} partant de l'angle huméral extérieur, et la 2^e du milieu de la largeur de l'élytre à peu près, et toutes deux s'inclinant vers la suture et se terminant sans atteindre le sommet.—RR. Trouvée sur la grève.

7. **Lébie axillaire.** *Lebia axillaris*, DeJ.—Longueur .25 pce. D'un marron foncé. Dessous, pattes, antennes, et bords du prothorax, jaunâtres. Chaque élytre porte aussi 2 taches de la même couleur, *la 1^{ère} grande, occupant presque toute la moitié antérieure, sans toutefois toucher aux bords; la 2^e petite, à l'extrémité, rapprochée de la suture*.—R.

8. **Lébie enfumée.** *Lebia fuscata*, DeJ.—Longueur .35 pce. Assez semblable à la précédente dans sa coloration, mais de plus forte taille. *La tache antérieure des élytres débouche à l'épaule, et la postérieure occupe toute l'extrémité*.—RR.

10. Gen. DROME. *Dromius*, Bonelli.

Tête peu rétrécie en arrière. Menton sans dent. Labre entier, transversal. Prothorax cordiforme et coupé carrément à la base.