

лубячого яйця, воно складає ся з великого числа рурочок, чи там каналиків, де витворює ся мужеське сімя. Ті каналики сплітають ся зі собою, а остаточно виходить лиш кільканайцять каналиків крізь задню стіну болонки, що обгортає саме яйце.

Поза яйцем сплітає ся зі собою тих кільканайцять каналиків поновно і творить приййче, що лежить при задній стінї яйця; само яйце стоїть довшою своєю осею з гори на діл, приййче прилягає поздовж до яйця і творить із яйцем одну цілість. Приййче грає велику ролю при тришровій хоробі мочевої цівки, бо то воно запалює ся під впливом тришрової зарази, і загально знана ся болюча хороба під назвою запалення яйця, хоч дійсно се запаленє приййча. Приййче грубіє в своїй горішній частині, а чим далше в долину тим менше воно обємисте, аж у кінці переходить в оден-одинюкий провід сімени, який веде від долішнього кінця приййча в гору, щоби через пахвинний канал в черевній стінї дістати ся до черевної ями. Разом із сіменним проводом маємо між яйцем а пахвинним каналом іще кровоносні судини, нерви і властивий мяз, що підносить яйце, а все те зібране разом творить сіменний мотузок, який можна вимацати крізь шкіру в мошинах. При сильнійшій стисненю сіменного мотузка між пальцями відчуває осмотрюваний мужчина властивий біль, що походить від нервів, обнятих у сіменнім мотузку. Також при натисканю на мужеське яйце