

Dose.— Comme émétique, 15 à 30 grains ; comme expectorant, 7 à 15 grains.

ULEXINE. (V. p. 835). — L'ulexine et la *cytisine* sont identiques. L'ulexine est employée dans l'hydropisie cardiaque. *Dose.*— 1/15 à 1/20 de grain.

UMBELLULARIA CALIFORNICA. (A) *California Laurel. Spice-tree.*

Propriétés.— *Usage.*— Les feuilles de cet arbrisseau de la Californie sont employées dans les névralgies, les céphalalgies, les coliques intestinales et les diarrhées atoniques. A l'extérieur, c'est un faible contre-irritant. Les feuilles contiennent encore une huile volatile, ayant un goût rappelant celui du camphre. Burse a obtenu, par distillation, une huile du nom de *Umbillol*, qui est un narcotique. Selon Schimmel & Co., elle contient aussi le *Cinéol*. L'*acide Umbellutique* est obtenu des semences. Il est probable que l'huile volatile est un anesthésique local puissant ; elle agit rapidement quand elle est appliquée sur la pulpe dentaire exposée, ou sur la dentine sensible.

UNGUENTINE. — On nomme ainsi un *Onguent d'alun*, contenant 2 p. 100 d'acide carbolique, et 5 p. 100 d'ichthyol. Employée dans le traitement externe de l'inflammation des plaies, brûlures, etc.

UNGUENTUM ACIDI BORICI. (F) *Pommade d'acide Borique.* (A) *Boric Acid ointment.* — Acide borique, 1 once, onguent de paraffine, 9 onces. Mêler.

UNGUENTUM COCAINE. (F) *Onguent de Cocaïne.* (A) *Cocaine Ointment.*

R. Br. — Cocaïne, 20 grains ; acide oléique, 80 grains ; axongé, 400 grains. Triturer la cocaïne avec l'acide oléique, chauffer légèrement jusqu'à solution ; ajouter l'axongé ; mêler.

UNGUENTUM CAPSICI. (F) *Onguent de poivre Rouge.* (A) *Capsicum Ointment.*

R. Br. — Baies de capsicum écrasées, 120 grains ; spermaceti, 60 grains ; huile d'olive, 1 once (Imp.). Chauffer au bain-marie pendant une heure, brassant souvent ; couler ; laisser refroidir sans brasser.

UNGUENTUM CONII. (F) *Onguent de Ciguë.* (A) *Conium Ointment.*

R. Br. — Suc de ciguë, 2 onces (Imp.) ; lanoline, $\frac{3}{4}$ once. Evaporer le suc de ciguë au bain-marie à un huitième de son poids, à une température n'excédant pas 140° F. (60° C.) ; ajouter la lanoline, mêler par trituration.

Appliquer localement sur les ulcères cancéreux ou douloureux. Il a peu de valeur thérapeutique.

UNGUENTUM HAMAMELIDIS. (F) *Onguent d'Hamamelis.* (A) *Hamamelis Ointment.*

R. Br. Extrait fluide d'hamamelis, $\frac{1}{4}$ once ; lanoline, 2 $\frac{1}{4}$ onces. Mêler. Employé pour les entorses.

UNGUENTUM HYDRARGYRI OLEATIS. (F) *Onguent d'Oléate de Mercure.* (A) *Mercuric Oléate Ointment.*

R. Br. — Oléate de Mercure, 1 once ; axongé benzoïnée, 3 onces. Mêler.

UNGUENTUM NAPHTOLI. (F) *Onguent de Kaposi.* (A) *Kaposi's Ointment.*

R. Br. — Beta-Naphtol, 60 grains ; axongé, 1 once.

Propriétés.— *Usage.*— V. Beta-Naphtol.