

Accipiter ruficaudatus, Vieill.—Vulg. *Autour à queue rousse, mangeur de poule*; Angl. *Red-tailed Hawk*.—Longueur 20-22 pouces; ailes 14-16; queue 8-9. Parties supérieures d'un brun foncé, plus léger et bordé de fauve sur la tête et le cou. Parties inférieures blanc-jaunâtre avec lignes longitudinales brun-rougeâtre, plus nombreuses à la poitrine et formant une bande transversale irrégulière sur l'abdomen. Queue d'un beau roux, terminée de blanc avec une bande noire sub-terminale; le dessous plus clair, quelquefois parfaitement blanc.

E. et C. S'approche souvent des bâtiments de ferme pour chasser aux volatiles domestiques. Se construit un énorme nid dans les branches de quelque gros arbre; pond 3 œufs d'un blanc jaunâtre sale avec taches de brun-jaunâtre, souvent entremêlées d'autres taches plus brunes.

4. Buse d'hiver. *Buteo hiemalis*, DeKay. *B. lineatus*, Jard. *Falco lineatus, hiemalis*, Gmel. *F. buteoides*, Nuttall.—Vulg. *Buse à manteau roux*; Angl. *Red-shouldered Hawk, Winter Hawk*.—Longueur 19-21 pouces; ailes 12-14; queue 8-9 pouces. Parties supérieures brunes, mêlées de taches rousses sur la tête et de blanches sur les couvertures et le croupion; rémiges tachées de blanc au bord extérieur avec barres alternes de blanc et de brun clair au bord interne. Parties inférieures orange-clair, avec taches et barres transversales blanches particulièrement sur l'abdomen et les tectrices inférieures de la queue; queue brun-foncé, terminée de blanc, avec 5 autres bandes blanches.

E. et R. Cette espèce qui est sédentaire dans le Massachusetts ne se montre que rarement en Canada. Elle chasse d'ordinaire les oiseaux de basse-cour, les perdrix, les tourtes, les lapins, etc. Elle niche au sommet d'arbres peu élevés; pond 2 œufs d'un blanc sale, avec taches, points et lignes d'un brun plus ou moins foncé.

5. Buse de Pennsylvanie. *Buteo Pennsylvanicus*, Bonap. *Falco Penns. Wils. F. Wilsonii*, Bonap.—Angl. *Broad-winged Hawk*.—Longueur 16-17 pouces; ailes 10-11; queue $6\frac{1}{2}$ -7 pouces. Bec bleu, plus foncé à la base; cire et tour des yeux jaunes; iris brun-noisette; pieds jaune foncé; ongles bruns. Parties supérieures d'un brun roussâtre, plumes de l'occiput et du derrière du cou blanches à la base; gorge blanche avec une tache brune de chaque côté s'étendant jusqu'à la base de la mandibule inférieure; poitrine avec taches cordées et sagittées d'un roux ferrugineux cendré; tache de même couleur sur l'abdomen, les flancs et les cuisses, se rangeant souvent en bandes; rémiges brunes, largement liserées de blanc au bord interne; queue brune, terminée de blanc avec une large bande blanche sub-terminale et plusieurs autres plus étroites près de la base. (Mus. Univ. Lav.).