

- Jambes et tarsi postérieurs annelés de blanc ;  
 Jambes postérieures blanches avec 2 anneaux  
 noirs ..... **1. tuberculifrons.**
- Jambes postérieures blanches avec 2 bandes  
 en dehors et une strie en dedans noires..... **2. erratica**
- Jambes et tarsi postérieurs d'un roux plus ou  
 moins brun; non annelés de blanc et de noir ;  
 Abdomen entièrement noir; jambes posté-  
 rieures noires..... **3. Canadensis.**
- Abdomen noir, plus ou moins varié de roux ;  
 Segments 2 & 3 marginés de roux..... **4. borealis.**
- Segments 1, 2 & 3 largement bordés de roux  
 à l'extrémité..... **5. rufofasciata.**
- Abdomen roux, taché de noir à la base et à  
 l'extrémité..... **6. macra.**

**1. Glypte à-front-tuberculeux.** *Glypta tuberculifrons*,  
 Walsh, Trans. Am. Ent. Soc. iii, p. 152, ♂ ♀.

♀—Long. .38 pce. Noir, brillant; les palpes, les scapulaires  
 avec un point en avant, blanc. Antennes sétacées, longues, brun-rous-  
 sâtre, noires à la base et à l'extrémité de même qu'en dessus. La face  
 avec un fort tubercule au milieu. Thorax à punctuations fines et  
 denses; métathorax à lignes soulevées distinctes, ses flancs plus ou  
 moins roussâtres. Ailes hyalines, iridescentes, les nervures brunes,  
 pâles à la base, le stigma brun. Pattes rousses; tous les trochantins  
 blancs; les cuisses postérieures noires à l'extrémité, leurs jambes blan-  
 ches avec 2 anneaux noirs, les 4 tarsi postérieurs noirs avec leurs  
 articles annelés de blanc à la base. Abdomen noir, fort, avec lignes  
 obliques bien marquées, le premier segment avec deux carènes dispa-  
 raissant avant d'atteindre le sommet. Tarière de la longueur de l'ab-  
 domen environ.

♂—Avec une pubescence blanche sur la face, la tache rousse des  
 flancs du métathorax souvent absente.

**2. Glypte erratique.** *Glypta erratica*, Cress. Trans.  
 Am. Ent. Soc. iii, p. 152, ♂ ♀.

♀—Long. .28 pce. Noir, brillant; le chaperon, les mandibules  
 excepté à l'extrémité, les écailles alaires avec une ligne en avant, blanc.  
 Antennes brunes, plus foncées à la base, à l'extrémité, et en dessus.  
 La face avec une protubérance arrondie au milieu. Métathorax poli,  
 brillant, avec une carène transversale à son sommet. Ailes hyalines,