

dans l'urine. Mais l'odeur si caractéristique de ce métalloïde ne put être constatée ni dans l'haleine, ni dans la sueur, ni dans l'urine.

La condition générale des malades resta la même. Aucun phénomène de narcotisme ne se produisit, ce qui est dû probablement au fait que le remède ne fut administré qu'à de très petites doses.—(*Journal of Cutaneous and Ven. Diseases.*)

Traitement de la syphilis infantile—(Clinique de M. le Dr ARCHAMBAULT à l'hôpital des enfants malades.)—Alors même que le diagnostic est nettement posé, la syphilis infantile est souvent soignée d'une manière défectueuse, surtout parce qu'elle est traitée d'une façon insuffisante. M. Archambault pose comme principe que ce traitement doit être institué dès que les premières manifestations syphilitiques sont observées; de plus il ne faut pas se borner à traiter la mère ainsi que font quelques médecins; cet intermédiaire est absolument insuffisant et ne peut être considéré que comme un adjuvant; il faut s'adresser directement à l'enfant et le médicament par excellence, dans ce cas, est le sublimé sous la forme de liqueur de Van Swieten administré dans du lait. Dans les cas de syphilis légère, on peut commencer par un milligramme; si au contraire la syphilis est grave, il faut arriver très rapidement à quatre ou cinq milligrammes tous les jours. La liqueur de Van Swieten étant, comme on sait, une solution au millième, et 1 gramme représentant 1 milligramme de sublimé, on en donnera dix gouttes le matin, dix gouttes dans l'après-midi et dix gouttes le soir, en augmentant tous les dix jours chacune de ces doses de deux gouttes, et on arrive ainsi à donner quatre ou cinq grammes de la solution.

Il est assez difficile d'indiquer le moment où on devra suspendre la médication; on se guidera pour cela surtout sur les résultats obtenus; il faut tenir grand compte dans ces cas de l'état de l'intestin. La diarrhée des enfants syphilitiques s'arrête ordinairement par l'action même du sublimé; cependant ce médicament peut quelquefois provoquer cet accident par lui-même. On peut alors ajouter à la dose quotidienne de la liqueur une dose de laudanum qui se trouve ainsi suffisamment fractionnée pour qu'on n'en craigne pas les effets toxiques. On peut aussi remplacer le sublimé par *l'hydrargyrum cum creta* à la dose de cinq à dix centigrammes.

Le traitement externe a souvent aussi ses indications; il peut être employé seul ou concurremment avec le traitement interne. M. Archambault toutefois ne l'emploie seul que quand le traitement interne est mal supporté. Il consiste dans des frictions faites matin et soir avec l'onguent mercuriel simple à la dose de 1 gramme à 1 gramme 50. Ces frictions développent souvent l'eczéma mercuriel; on peut l'éviter en changeant souvent le siège des frictions et en lavant ces parties avec une eau légèrement savonneuse. Les médecins anglais remplacent les frictions par l'application sur le corps d'une ceinture de flanelle large comme la main et enduite de la même quantité d'onguent mercuriel.

Les bains de sublimé peuvent encore être utilisés dans le traitement externe: ils hâtent surtout la disparition des manifestations locales de la peau, et M. Archambault les emploie concurremment avec le traitement interne. On peut mettre 2 à 6 grammes de sublimé dans un bain; et celui-ci peut être donné dans une baignoire métallique, pourvu