

I. Je prendrai en premier lieu le cas d'un enfant qui, à la faveur d'un canal inguinal incomplètement obitéré, a étranglé une hernie jusqu'alors facilement réductible, l'accident ne remontant pas à plus de 6 heures. Le résultat de mon observation personnelle, dans les grands services hospitaliers des enfants malades et des enfants assistés, m'a prouvé que la conduite généralement tenue en pareil cas était souvent couronnée de succès. On sait en effet que sous l'influence d'un bain tiède prolongé le hernie se réduit souvent chez l'enfant presque sans effort; au besoin quelques gouttes de chloroforme au sortir du bain, en déterminant une résolution musculaire complète facilite la réduction. C'est que chez l'enfant la contracture musculaire joue le principal rôle, en contractant sur l'intestin un orifice fibreux demeuré anormal dans ses dimensions par suite d'un défaut d'évolution de la paroi abdominale. On comprend donc qu'il puisse être possible, une fois la résolution musculaire obtenue, de réduire une anse intestinale qui s'est étranglée en s'engageant à travers un orifice qui, en raison de l'âge, de l'anomalie de développement, a conservé une souplesse et des dimensions que l'on ne retrouve pas plus tard. Et, de fait, ces hernies se réduisent parfois d'elles-mêmes sous la seule influence du bain. Je dirai donc qu'en pareille occurrence on a le droit de faire un essai de taxis, mais sous la réserve suivante, absolument formelle et avec laquelle on n'a pas le droit de transiger: il faut, pour se permettre d'avoir recours au taxis, que, pour une raison que je n'ai pas à discuter, l'opération chirurgicale ne puisse être immédiatement pratiquée: dans ce cas, mais dans ce cas seul, en attendant le chirurgien on peut essayer le taxis chez l'enfant, à condition cependant que le début des accidents ne remonte pas à plus de six heures, ce qui permet d'espérer que l'intestin n'a encore perdu en rien de sa vitalité, et que, d'autre part, on ne mette pas plus d'effort à réduire l'anse étranglée que l'on n'en mettrait à réduire une anse intestinale non étranglée, normalement réductible.

II. Chez l'adulte, au contraire, même dans le cas en apparence le plus favorable, le taxis ne doit jamais être tenté ainsi que je vais tâcher de le prouver.