

pas connaissance de l'invasion de la grippe je songeais tout d'abord à la fièvre typhoïde et ne pus rectifier mon diagnostic que quelques jours plus tard. En effet, l'épidémie parut débiter à l'hôpital même d'où elle gagna les quartiers voisins et le reste de la ville, ce qui rendit à ce moment sa nature indéterminée pendant quelques jours. Peu de temps auparavant il y avait eu dans le service plusieurs malades en traitement pour de la fièvre typhoïde ; faut-il penser que le germe épidémique de la grippe avait été influencé par eux et que celle-ci, développée dans ce milieu, a pris de ce fait un caractère spécial ; c'est peut-être exact, mais on ne peut l'affirmer. Toujours est-il qu'en envahissant le voisinage elle conserva ce caractère ; or, cette partie de la ville avait été pendant l'automne le siège d'une légère endémie typhoïde. Il est donc possible que des conditions locales aient modifié les allures de la grippe, et à ce propos il faut faire remarquer que l'épidémie de grippe de 1833, qui a été surtout caractérisée par la fréquence des cas du type cholériforme, succédait, presque sans transition, à la grande épidémie de choléra de 1832.

La grippe à forme typhoïde, dont la maladie que je viens de vous présenter est un exemple, est assez rare. Son début est brusque, presque sans prodromes, et se fait par de petits frissons répétés, du malaise, de l'abattement, de la céphalalgie et des douleurs musculaires, occupant les membres et la région lombaire. Ces symptômes apparaissent simultanément et la maladie terrasse rapidement l'individu, qui est de suite contraint à s'aliter. Des épistaxis, des vertiges, des vomissements peuvent les suivre ; la constipation est la règle et la langue se revêt d'un enduit blanchâtre comme pseudo-membraneux. En trois ou quatre jours l'état s'aggrave, les malades ont de l'insomnie, du délire de la surdité, et prennent l'aspect typhique ; parfois survient même, comme dans la forme ataxo-adyynamique, un demi-coma avec hallucinations, carphologie et soubresauts des tendons. Nous avons vu cette période d'excitation nerveuse durer ainsi un septénaire, et c'est pendant son développement que se montrent les accidents abdominaux. La constipation du début peut persister, mais elle est souvent remplacée dès le second ou le troisième jour par de la diarrhée. Les selles sont alors nom-