

parence minime des boissons provoque immédiatement une diminution de la sécrétion urinaire."

Le seul aliment doit être le lait donné en quantité d'une pinte mouillé d'une chopine d'eau, à prendre dans les 24 heures. Dès le premier jour l'action diurétique se manifeste, augmente le second et le troisième jour et se continue les jours suivants. Ces malades urinent de grande quantité de chlorure, ils absorbent à peine 35 grains de chlorure qui contient trois chopines de lait et ils éliminent 150 à 200 grains de chlorure. La réduction de liquides est donc aussi une cure de déchloruration des tissus, qu'il s'agisse d'une cardiopathie artérielle ou d'une cardiopathie valvulaire. S'il existe des épanchements pleuraux, de l'ascite ou de l'œdème des membres il y a lieu d'activer la diurèse en donnant matin et soir avant le repas 7 grains de Théobromine, dans l'intervalle du traitement par la digitale.

Lorsque l'œdème trop tendre comprime les voies de résorption les mouchetures diminueront la résistance périphérique et favoriseront l'action de la digitale et de la théobromine. Le malade allant mieux, le repos est encore nécessaire quand le myocarde a été fortement dilaté, le massage, particulièrement le massage abdominal qui aide à combattre la stase sanguine sera supérieur à la marche. L'alimentation sera sévère et graduellement croissante. Le malade ne doit pas trop boire de crainte de provoquer une pléthore vasculaire qui augmente le travail du cœur. Deux litres (pintes) de lait dans les 24 heures suffisent, plus tard un potage aux farines alimentaires ou aux légumes, puis si l'amélioration continue on permet du pain, des œufs, du riz et on prescrit pour un certain temps le régime lacto-végétarien achloruré jusqu'à ce que tous symptômes d'hyposytolie soient disparus.

Si, au contraire, malgré toute thérapeutique l'asystolie persiste, c'est que le myocarde a épuisé toutes ses forces de résistance, qu'il existe une cachexie ou une artério-sclérose généralisée irrémédiable.

L'énorme dilatation cardiaque, l'hydrothorax, l'œdème pulmonaire, l'hypertrophie ou la sclérose du foie, etc., toutes ces lésions sont irréductibles. La digitale est impuissante et même toxique, il faut avoir recours à la caféine à dose de 5 à 8 grains en injections sous-cutanées qu'on alterne à toutes