

3. **Lophyre fauve.** *Lophyrus fulvus*, Nort. Trans. Am. Ent. Soc. IV, 86.

♀ Long. .30 pce. Trapu, d'un fauve pâle; les antennes, une tache à l'endroit des ocelles, une bande longitudinale sur chacun des lobes latéraux du mésothorax, tout le métathorax, les plaques basilaires avec le premier segment abdominal, une tache à la poitrine, avec une autre à la base du ventre et les valves de la tarière, noir. Antennes de 13 articles, courtes, plus épaisses au milieu et dentées en dedans. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma jaunâtre; la cellule lancéolée fermée au milieu, subpétiolée. Pattes de la couleur du corps, les tarses brunâtres. —Hull (Harrington).

Capturé sur des pins dans le voisinage de Hull par M. Harrington; ♂ encore inconnu.

*Autres Additions*

2. Gen. TRICHIOSOMA, Leach, p. 176.

Aux 2 espèces américaines encore connues, ajoutez la suivante.

**Trichiosome de-Taylor.** *Trichiosoma Taylora*, n. sp.

♀—Long. .60 pce. Noir avec pubescence blanchâtre, cette pubescence plus longue et plus dense sur le thorax et la base de l'abdomen. Le chaperon avec une petite échancrure au milieu, le labre allongé et anguleux en avant. Antennes à funicule grêle. Ailes hyalines-jaunâtres, les nervures brunes, le costa jaune avec une tache noire au stigma qui s'allonge en pointe jusque près de la moitié de la 2<sup>e</sup> radiale. Pattes noires avec les jambes et les tarses jaunes; les cuisses postérieures avec une petite-dent vers l'extrémité. Abdomen noir avec les trois derniers segments bordés de jaune, les plaques terminales jaunes en dessous.

♂—Long. .80 pce. Mandibules allongées, avec 2 fortes dents au-dessous de leur pointe. Les 4 cuisses postérieures renflées avec une dent de chaque côté vers l'extrémité; leurs hanches très allongées et portant 3 fortes dents sur leur tranche extérieure. Bordure jaune de l'abdomen commençant vers le milieu et couvrant entièrement les 2 segments terminaux tant en dessus qu'en dessous.—Vancouver (Fletcher).