

omloop van mijn bloed betreft, aan eene hoogte van vier duizend meters beantwoordt."

„Slechts dan, als al deze omstandigheden behoorlijk in acht genomen worden, kan men met eenige zekerheid algemeene stellingen bepalen over den invloed van de hoogte der bergen op den omloop des bloeds, en dan kan die mogelijk als een toevallige maatstaf ter bepaling der hoogte van een standpunt beschouwd worden, een maatstaf, die echter voor ieder, die dien wil bezigen, door eigene ervaring eerst gewijzigd worden moet, dewijl men *a priori* hier niets bepalen kan (*).

Over de verspreiding der planten of de grenzen van den groei in de *Pyreneën*, merkt de heer PARROT het volgende aan:

De pijnboom (*Pinus Sylvestris*) wordt op de noordzijde van het gebergte zeer algemeen tot twee duizend een honderd meters, en op de zuidzijde tot op de hoogte van twee duizend twee

(*) Hoewel de heer PARROT de eerste was, die den *Maladetta* beklom, zoo is hij evenwel niet op het hoogste punt van denzelfden, namelijk op den *Pic de Nethou* geweest, die, gelijk uit de vorige tabel blijkt, volgens de trigonometrische meting van de heeren RIBOUL en VIDAL een duizend zeven honderd zeven en zestig *toisen* hoog ligt, maar op eenen lageren top, welkers hoogte hij door den barometer op drie en dertig duizend negen en zes tiende meters bepaalt.

DE VERT.