

Actualités Avicoles

PINTADES

"C'est des pintades; ça pond et ça cache les œufs; à part cela c'est pareil comme des poules."

C'est ainsi que me qualifia les pintades, ou poules de Guinée (Guinea hens), un garnement de quinze ans qui surveillait un troupeau de ce joli et gentil volatile.

Le gamin avait raison. La pintade, plus sauvage de sa nature que la poule, donne une ponte abondante, qu'elle cache le plus qu'elle peut.

La pintade nous paraît être une espèce intermédiaire du dindon et de la poule. A l'instar de ce dernier, elle est vagabonde. Il lui faut de l'espace. Farouche et quelque peu féroce, la pintade n'a jamais pu vivre en amitié avec les troupeaux de poules, qu'elle terrorise assez facilement. Elle fonce dessus, à l'improviste un peu à l'iroquoise, puis elle se retire dans ses quartiers, lesquels sont la plaine, les champs, au oin. Un naturaliste me disait: "Voyez donc si ça a le trot hypocrite, une pintade".

En effet, la pintade ne marche pas, ne court pas non plus. Elle trotte, d'un petit train et au cours de sa "trotte", elle se tient la tête modestement baissée vers le sol.

Les pintades sont-elles rhumatisantes? Pas du tout. N'empêche pas qu'elles pressentent les pluies. Veille d'orage, elles piaillent continuellement.

Le petit de la pintade, le pinta-deau, est d'une joliesse à nulle autre comparable.

La chair de la pintade, à peu près inconnue sur les tables de nos hôtels et de nos restaurants, est des plus savoureuses et d'une fine délicatesse.

L'élevage de la pintade est rémunérateur si on a beaucoup d'espace à lui donner.

Que diriez-vous si vos cheveux repoussaient dans un mois?

Vous devriez chauve, vos cheveux se fanent et tombent? Si vous désirez refaire immédiatement votre chevelure, je vous enverrai, gratuitement, un échantillon du fameux Glandahair Alexander. Aucun déboursé, aucune obligation de votre part. Envoyez simplement votre nom à Alexander Laboratoire, 242, Edifice Bohan, Toronto, Canada.

L'examen du rucher au printemps

Lorsque vous aurez sorti vos ruches de la cave, profitez de la première journée chaude où elles volent librement pour les examiner. Assurez-vous à cet examen que chaque ruche a une bonne reine et une quantité suffisante de provisions. Examinez aussi les ruches qui ont été hivernées en plein air: mais ne les sortez pas des caisses dans lesquelles elles se trouvent avant qu'elles aient commencé à déposer du miel dans la première hausse, généralement vers la fin de mai. Ce premier examen doit être aussi rapide que possible; il ne faut pas en effet exposer le couvain à se refroidir. La présence d'œufs et de larves indique qu'il y a une reine. Si les opercules qui recouvrent le couvain sont presque plats, c'est un couvain d'ouvrières, mais si les opercules sont très soulevés, c'est un couvain de bourdons et dans ce cas il faut tuer la reine. Toutes les ruches faibles ou sans reine doivent être réunies

à des ruches moyennement peuplées et pourvues d'une reine. Si on le désire, ou si la chose est nécessaire, on peut sauver une colonie faible qui contient une reine précieuse en la plaçant par-dessus une colonie forte—assurez-vous d'abord que la colonie faible a du couvain. S'il n'y en a pas, fournissez un rayon contenant une petite parcelle de couvain que vous aurez pris dans la colonie forte, par-dessus laquelle la faible doit être placée. Le soir enlevez le couvercle de la colonie forte, mettez un chasse-reine, posez la colonie faible par-dessus ce chasse-reine, sans la planche de base. Ayez soin de déranger les abeilles le moins possible sinon elles tueront la reine de la ruche supérieure. Deux ou trois semaines plus tard, enlevez, pour la mettre sur un nouveau support, la ruche qui contient le plus de couvain.

Au premier examen, chaque ruche devrait avoir de 10 à 15 livres de provision. S'il n'y a pas de maladie dans le rucher, on pourra prendre des rayons de miel dans les colonies qui ont un surplus et les donner à celles qui en manquent. Comme la plupart des provisions seront trouvées dans les rayons extérieurs, on transportera ces rayons près du couvain. Les abeilles consommeront ce miel beaucoup plus rapidement si l'on a soin, au préalable, de casser les opercules. Si l'on n'a pas de rayons de miel, on donnera aux ruches faibles du sirop composé de sucre ou de miel. N'étalez pas le couvain car vous vous exposerez à en perdre une grande quantité par le refroidissement.

Maintenant que chaque colonie a une reine et une quantité suffisante de provisions, il ne sera pas nécessaire de faire un examen avant deux ou trois semaines, surtout si le temps reste chaud. Au deuxième examen assurez-vous que la reine a suffisamment de place pour élever du couvain et qu'elle a suffisamment de provision pour les abeilles. Si vous vous servez de ruches plus petites que la ruche Langstroth à dix cadres, il peut être nécessaire d'augmenter la dimension de la chambre à couvain en ajoutant une autre hausse. Ne laissez pas la chambre à couvain se remplir d'abeilles ou de miel sinon les abeilles feront des préparatifs pour l'essaimage. A ce deuxième examen, veillez bien pourvoir s'il n'y a pas de maladie.—C. B. GOODERHAM, apiculteur du Dominion.

Une découverte scientifique permet de chasser la vermine

L'eau minéralisée remplace les poudres insecticides. Les oiseaux se débarrassent eux-mêmes des poux. Excellent pour tous jeunes poussins et pour toute la basse-cour.

Ce merveilleux produit immunise la volaille contre les poux, et cela d'une manière permanente, et sans travail aucun de la part de l'éleveur. C'est la méthode la plus simple, la plus facile et la plus sûre jusqu'ici découverte.



H. T. Thorne, de Fleming, Saskatchewan dit: "J'ai essayé le Lice-Go et ne saurais maintenant m'en passer".

G. W. Marshall, Stewiacke, N. S., dit: "L'été dernier j'ai employé le Lice-Go pour mes poussins et mes poules et je crois que c'est un bon article".

H. N. Olson, C. P. 28, Edgerton, Alta., dit: "Vos tablettes Lice-Go ont produit des merveilles sur nos poulettes et tous nos voisins veulent en avoir".

M. A. Urquhart, Zephyr, Ont., dit: "Les comprimés Lice-Go sont exactement tels que vous les représentez. Je vous en ferais plus tard une commande plus considérable".

Le Lice-Go est versé dans l'abreuvoir, absorbé par la constitution de l'animal il en sort par les glandes huileuses de la peau, et alors les poux et les mites s'enfuient. Garanti aider l'éclosion et n'affecter la saveur ni des œufs ni de la chair; inoffensif et n'affecte pas non plus le plumage. Quelques jours de traitement au début, puis ajouter un peu de Lice-Go dans l'eau, une fois par mois suffit.

N'envoyez pas d'argent, mais votre nom et votre adresse seulement. Une carte suffit. Nous sommes si sûrs que Lice-Go vous débarrassera de tous poux ou mites que nous vous enverrons pour \$1. un paquet (double force) suffisant pour 100 gallons d'eau. Lorsqu'il vous arrivera vous paierez à la poste \$1. plus quelques sous pour le transport. Si après essai de 30 jours vous n'êtes pas absolument satisfait votre argent vous sera rendu.

THE A. B. WARDER Co.,
Box 11 G. Warton, Ont.
Commande payée comptant, 3 paquets pour \$2.00.

Lisez le Bulletin de la Ferme

CONCOURS DE PONTE, A L'EST ET A L'OUEST DE QUEBEC

Les concours se sont ouverts le 1er novembre 1923 et se continueront pendant 52 semaines. Chaque parquet contient 10 oiseaux, numérotés de 1 à 10.

Les tableaux ci-dessous donnent dans les colonnes 1 à 10, un état de la production de chaque oiseau pour la semaine. Dans la colonne "H" se trouve le total de la production hebdomadaire de chaque parquet et dans la colonne "T", le nombre total d'œufs à jour dans chaque parquet. Lorsque le nombre total d'œufs est plus élevé que le nombre totalisé d'œufs pondus par chaque poule dans la semaine, cela indique que les œufs pondus sur les planchers ont été inclus dans le relevé total du parquet.

Remarques:—Les parquets des Stations Expérimentales sont inscrits en vue de l'enregistrement, mais ils n'ont pas droit aux prix offerts.

Abréviations:—C.H.—Chanteclercs; L.B.—Livournes blanches; P.R.B.—Plymouth Rock Barrées; R. I. R.—Rhode Island rouges; W.B.—Wyandottes blanches; W.A.—Wyandottes argentées; Z.—Parquet en tete; F.—Fièvre d'incubation; M.—Muant.

Sous la direction de la Station Expérimentale à Ste-Anne-de-la-Pocatière

2ème année. Rapport Hebdomadaire. Semaine No 25. Finissant le 23 avril 1924

Sous la direction de la Station Expérimentale de Lennoxville.

2ème année. Rapport Hebdomadaire. Semaine No 25. Finissant le 23 avril 1924

Parquet	Propriétaire et adresse	Race	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H.	T.
1	Institut Agricole d'Oka, La Trappe.	Ch.	3	2	5	3	4	5	1	...	6	29	495	
2	J. G. Liard, St-Alexis, Qué.	L.B.	7	6	6	6	6	7	7	6	6	x63	720	
3	W. A. Carr, Ste-Agathe, Qué.	P.R.B.	5	6	5	5	1	5	...	5	6	2	40	x896
4	Elie Jodoin, Varennes, Qué.	P.R.B.	1	6	5	2	...	5	7	1	...	27	567	
5	Raoul Pettigrew, Isle Verte, Qué.	P.R.B.	3	...	4	...	3	...	2	2	3	4	21	326
6	J. A. Proulx, Montmagny, Qué.	P.R.B.	...	5	6	...	3	...	3	7	6	1	31	425
7	Station Expérimentale, La Ferme.	P.R.B.	7	...	5	...	3	6	5	1	4	5	36	602
8	Station Expérimentale, Ste-Anne.	P.R.B.	4	3	2	5	5	...	1	3	...	3	28	666
9	Acad. St. Ls de France, St. Jacques.	R.I.R.	6	...	...	5	...	4	3	5	...	23	644	
10	Auguste Beaulieu, Grand Remou.	R.I.R.	6	...	...	4	1	6	4	6	5	4	36	549
11	J. S. Blais, East Broughton, Qué.	R.I.R.	...	6	...	1	5	3	...	5	3	23	523	
12	Georges Bouchard, M.P., Ste-Anne.	R.I.R.	5	4	...	2	3	...	3	4	5	4	30	519
13	Antoine DeRoy, Princeville.	R.I.R.	...	4	2	6	5	...	5	2	...	28	578	
14	Alexandre Fournier, Montmagny.	R.I.R.	1	4	7	5	5	2	...	5	3	3	35	481
15	Jos.-C. Hébert, N.P., Montmagny.	R.I.R.	5	4	2	4	6	4	4	4	4	4	37	875
16	Chs.-E. Paquet, Pont-Rouge, Qué.	R.I.R.	6	6	5	6	6	4	6	3	5	5	46	738
17	Station Expérimentale, Ste-Anne.	R.I.R.	4	...	1	3	4	3	5	...	2	3	25	618
Production: 46.9%													558	1027

Poulette No 42 appartenant à M. W. A. Carr, Ste Agathe, a pondu à date 124 œufs
 " " 41 M. W. A. Carr, " " " 180 "
 " " 49 M. W. A. Carr, Ste Agathe, " " " 119 "
 " " 91 Station Expérimentale, Ste. Anne, " " " 110 "

Gérant du Concours: Jean-L. Roy.

Régisseur, J.-A. Ste-Marie.

N. B.—Adresses toute correspondance au Régisseur, Station Expérimentale, Ste-Anne-de-la-Pocatière, Qué.

Parquet	Propriétaire et adresse	Race	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H.	T.
1	Laurel P. Farm, Rougemont.	L.B.	6	5	2	5	4	2	5	5	4	5	43	x818
2	Jos. Williams, Sawyerville.	L.B.	6	4	2	4	5	5	2	6	6	2	42	667
3	H. S. Beane, Beebe, Que.	L.B.	5	3	5	5	3	5	5	6	6	4	47	664
4	Elmhurst P. Farm, Rougemont, Qué.	L.B.	2	4	3	3	1	0	2	5	3	5	29	468
5	Dr. John Watson, Howick.	L.B.	4	2	5	4	4	4	4	5	3	1	37	541
6	E. G. White, Lennoxville, R.R. No 1.	W.B.	2	5	3	1	0	2	0	0	0	7	20	778
7	H. S. Beane, Beebe, Qué.	W.B.	6	5	6	6	6	3	6	6	5	x56	761	
8	Bond Little, North Hatley.	W.B.	1	5	2	4	5	2	3	4	3	5	34	748
9	Fred Bell, Ayer's Cliff.	W.B.	6	1	2	3	5	4	1	5	5	3	35	643
10	Miss R. G. Knight, Beebe, Qué.	W.B.	2	5	1	5	3	5	2	2	6	3	34	715
11	Chas Ruiter & Sons, Cowansville.	W.A.	2	3	4	4	0	5	3	5	5	3	34	455
12	Exp. Farms, Ste-Anne-de-la-Pocat.	R.I.R.	0	2	0	1	1	0	4	0	3	3	16	280
13	Fred Bell, Ayer's Cliff.	R.I.R.	2	6	5	4	5	5	3	5	5	6	46	538
14	Laurel P. Farm, Rougemont.	P.R.B.	5	7	5	1	2	4	4	2	4	4	38	553
15	Exp. Station, Lennoxville.	P.R.B.	6	0	5	6	7	6	5	4	6	6	51	663
16	Exp. Station, Lennoxville.	P.R.B.	4	7	2	5	6	0	3	5	6	6	45	757
17	A. P. Hillhouse, Foster.	P.R.B.	4	4	0	3	4	4	2	4	3	3	31	613
18	Dr. Stockwell, Stanstead.	P.R.B.	3	0	4	1	0	0	1	0	4	3	16	192
19	Wm. C. Strong, West Brome.	P.R.B.	5	0	5	3	0	0	3	5	1	2	25	429
20	H. R. Drew, North Hatley.	P.R.B.	1	3	2	4	3	6	0	2	4	3	29	565
Production: 50%													708	11848

La poule No 82 de Bond Little, North Hatley, R.I.R., a pondu à date 121 œufs.
 " " 18 de Laurel P. Farm, Rougemont, Qué., a pondu à date 116 "
 " " 151 a pondu à date 106 "
 " " 17 de Laurel Farm, a pondu à date 103 "

Gérant du Concours: J. D. Lang.

Surintendant: J. A. McClary.

N. B.—Prière d'adresser toute correspondance au surintendant de la Station Expérimentale, Lennoxville, Qué.