

REVUE DES JOURNAUX

LA PLEURITE SECHE PRECORDIALE

Par CH. MANTOUX

Ancien interne des hôpitaux de Paris

La pleurésie sèche, lorsqu'elle se localise à la région précordiale, peut donner lieu à une série de symptômes très particuliers qui ne paraissent pas avoir, jusqu'ici, fixé l'attention des cliniciens. Il nous a semblé intéressant de les étudier.

Les pleurésies sèches précordiales ont comme caractère essentiel d'être très discrètes en tant que signes physiques; elles se caractérisent uniquement par des petits frottements très fins, très secs, très superficiels, synchrones aux mouvements respiratoires et indépendants du rythme cardiaque; c'est là un caractère essentiel qui les distingue des frottements péricardiques; ils disparaissent par conséquent quand le malade retient sa respiration. On les entend mal au stéthoscope; ils se perçoivent beaucoup mieux à l'auscultation directe, surtout quand on appuie fortement l'oreille contre le thorax du patient. Tantôt ils couvrent toute

Syphilis
Artério-sclérose, etc.
(Ioduro Enzymes)
Todore sans Todisme

Todurase

de COUTURIFUX.

57, Ave. d'Antin, Paris,
en capsules dosées à 50 ctg. d'Io-
dure et 10 ctg. de Levuline.