

5° L'électricité sous ses deux formes en constitue le traitement approprié. Les courants continus de faible intensité sont préférables aux courants d'induction. Mais on peut avantageusement associer les deux formes d'électricité, et y ajouter le massage.—*Lyon Médical*.

Influence possible des vésicatoires sur la purulence de la pleurésie.—En étudiant les conditions qui peuvent déterminer la purulence de la pleurésie, M. Bucquoy a cité en particulier un fait qui présente un très grand intérêt pratique. On sait que l'albuminurie constitue une des conditions les plus favorables de la production de la pleurésie purulente. Or, chez un jeune garçon entré dans le service avec une pleurésie de cette nature, cette circonstance étiologique existait bien en réalité, mais en rétablissant l'histoire du malade, on reconnaissait qu'il existait là certaines particularités cliniques très importantes. La pleurésie datait d'un mois environ et ne présentait rien dans sa marche qui eût pu faire supposer sa purulence: mais elle avait été traitée en ville, pendant ce court espace de temps, par l'application successive de huit vésicatoires. Cette application intempestive avait déterminé de la néphrite cantharidienne avec des urines sanguines et consécutivement une albuminurie persistante; enfin, sous l'influence de l'albuminurie, la pleurésie était devenue purulente. C'est ainsi qu'on peut expliquer la filiation des accidents dans ce fait qui montre ainsi que l'abus des vésicatoires dans la pleurésie peut être particulièrement nuisible au point de vue des modifications qu'il peut apporter indirectement à la nature de l'épanchement.—*Journal de méd. et de chir. prat.*—*Revue de Thér. médico-chirurgicale*.

Traitement de l'hémoptysie active du début de la tuberculose.—Quelle doit être la conduite du médecin devant une hémoptysie active du début de la tuberculose? Voici la réponse faite à cette question par M. Ferrand dans ses conférences si pratiques de l'hôpital Laennec.

Contre cette hémorrhagie, le médecin a plusieurs moyens thérapeutiques qui ont été préconisés par différents cliniciens. Il y en a d'abord un qui semble banal, tellement son emploi est simple et rationnel: la saignée. Il est tout naturel, en présence d'un effet circulatoire exagéré, d'ouvrir sur un point quelconque du système circulatoire une décharge et de lui