

*Observation.*

Madame G. C... femme d'un journaliste bien connu du *Tout Paris*, vient nous consulter (clinique du Dr Abadie) pour une affection de l'œil droit, que nous reconnaissons être une irido-choroïdite d'origine spécifique. Nous la persuadons de suivre un traitement consistant en une série d'injections mercurielles sous-éutanées.

La première injection étant faite, la malade s'en retourne chez elle, très bien, ne ressentant aucun malaise. Dans le courant de la nuit on vient nous chercher à la hâte. Nous trouvons la malade très pâle, et se plaignant de vomissements et de fortes crampes d'estomac avec coliques épouvantables et diarrhée.

Chez cette personne, qui est très bien aujourd'hui, nous n'avons pu dépasser une demi-seringue, (un demi-centigramme) soit, la moitié de la dose maximum.

Il est donc prudent de commencer par injecter un quart de la seringue et monter progressivement jusqu'au niveau de tolérance du sujet. Pour les enfants on commencera par un huitième de la seringue et on ira jusqu'à un demi-centimètre de la solution c'est-à-dire jusqu'à une demi seringue. Nous avons eu un jeune malade âgé de 14 ans, atteint d'otite sécléreuse et de kératite parenchymateuse; chez lui nous avons élevé la dose jusqu'à un centigramme, mais c'est assez rare; et même chez ces petits malades il faut agir avec une extrême prudence.

Le traitement mercuriel, comme tout espèce de traitement, n'agit que lorsqu'il est continué pendant un certain temps.

Voici comment nous procédions chez le Dr Abadie, pour nos injections intra-veineuses.

*Première Série.*

Vingt injections, une tous les deux jours. Un repos de vingt jours.

*Deuxième Série.*

Vingt injections, une tous les trois jours. Un repos de vingt jours.

*Troisième Série.*

Vingt injections, une tous les quatre jours. Un repos de vingt jours.

*Dernière Série.*

Une injection par semaine tant que le médecin le jugera nécessaire.

Nous avons eu des patients qui, quoiqu'ayant cessé leur traitement revenaient à des époques plus ou moins éloignées, pour une série de quatre à six injections.

(A suivre.)