

Pommade, friction, ou bien

Iodoforme.....	1 gramme.
Vaseline.....	20 "

En frictions, ou bien

Teinture d'iode.....	} ââ 5 grammes.
Teinture de galle.....	

En badigeonnages, ou bien

Iodure de potassium.....	1 gramme.
Iode pur.....	0 gr. 10 centigr.
Onguent émollient.....	20 grammes.

Pommade, en frictions.

Comme pansement local, le pansement humide (ouate et gutta-percha) convient le mieux.

Valeur thérapeutique du calomel dans la grippe, par BERGMANN, dans la *Thérapeutique Moderne Russe*.

L'auteur, après trois ans d'expérience, est convaincu qu'à l'heure actuelle, le *calomel* constitue le meilleur agent thérapeutique dans la grippe. Son action se fait remarquer par une chute brusque de la température et de tous les symptômes quelquefois graves qui l'accompagnent. Il le donne dans toutes les formes—nerveuse, catarrhale, gastro-intestinale—de la façon suivante :

1° *Forme nerveuse et catarrhale*.—Il donne le calomel à la dose de 0 gr. 12 centigr. répétée toutes les deux heures jusqu'à effet purgatif intense. On dépasse rarement six doses semblables.

2° *Forme gastro-intestinale*.—Il donne une dose de 0 gr. 36 centigr. qu'il fait répéter au bout de 6 heures s'il n'y a pas de selles. Quelquefois cette dose est remplacée par 30 grammes d'huile de ricin.

Dans aucun de ces cas il n'y a eu de complication, et l'auteur s'en est particulièrement bien troué dans la forme nerveuse qui est la plus grave.

Son mode d'action se résume dans l'antiseptie intestinale qu'il réalise au plus haut degré.

Iodure de potassium et coliques hépatiques, par DOUNINE, en Allemagne, dans la *Revue Thérapeutique*.

L'auteur a employé l'iodure de potassium dans les accès fréquents de coliques hépatiques. Un autre auteur a obtenu d'excellents résultats par cette méthode. Il fait une solution de 200 grammes d'eau contenant 4 à 6 grammes d'iodure de potassium chimiquement pur qu'il fait ingérer à la dose de deux cuillerées à soupe par jour.

Cette médication voit les douleurs diminuer d'intensité et de fréquence; la région de la vésicule biliaire est moins douloureuse à la pression. Après deux ou trois flacons, les malades peuvent être considérés comme guéris.

Cette médication peut être employée dans les cas où persiste une douleur sourde dans l'hypocondre à la suite d'une attaque. Le mode d'action est inconnu. L'iodure agit-il comme dissolvant ou comme antispasmodique? Nous ne le savons pas.

J.-A. LESAGE.