

Pour faciliter la tâche aux médecins qui ne peuvent pas se procurer le *materna*, nous donnons ci-dessous quelques formules empruntées à Rotch et qui donnent des résultats équivalents. (1)

FORMULE (a).

Utilité après gastro-entérite, lorsque le lait peut être repris.

M. grasses	1.00	Crème	2 onces
Sucre de lait	5.00	Lait	2 —
Caséine	0.75	Eau de chaux	1 —
Eau de chaux	5.00	Eau	15 —
			20 onces
		Sucre de lait, 7 cuillerées à the.	

FORMULE No 1.

Indiquée après 2 ou 4 jours d'alimentation avec formule No (a). Aussi convient à l'enfant en bonne santé du 3^e au 14^e jour.

M. grasses	2.00	Crème	4 onces
Sucre de lait	5.00	Lait	nul
Albuminoïdes	0.75	Eau de chaux	1 once
Eau de chaux	5.00	Eau	15 onces
			20 onces
		Sucre de lait, 8½ cuillerées à the.	

FORMULE No 2.

Pour l'enfant de 2 à 6 semaines.

M. grasses	2.50	Crème	5 onces
Sucre de lait	6.00	Lait	nul
Caséine	1.00	Eau de chaux	1 once
Eau de chaux	5.00	Eau	14 onces
			20 onces
		Sucre de lait, 8½ cuillerées à the.	