

supérieure de la bande médiane des élytres est droite au lieu d'être courbe.

*C. VULGARIS*, var. *VIBEX*, Horn.—Trouvée dans l'île de Vancouver par le Rév. Geo. W. Taylor.—N'est qu'une variété verte de la *C. vulgaris* dans laquelle la bande médiane n'atteint pas le bord des élytres

*C. OREGONA*, Lec.—Semblable à la *C. repanda*, mais de coloration brun-bronzé ou olive, avec la bande médiane n'atteignant pas la marge de l'élytre. Les points blancs sont gros et les lignes courbes, interrompues. Colombie anglaise et île de Vancouver.

*C. PUSILLA*, Say.—Territoire de la baie d'Hudson, selon Schaupp. Noire, petite (12 mm.), bleu ou verdâtre en dessous, avec jambes pâles à leur base ; labre tridenté. Les taches de la base et du sommet des élytres sont à peine visibles, et la tache courbe médiane s'étend jusqu'à la marge des élytres. Quelquefois il n'y a guère que la partie marginale de cette tache qui soit distincte.

*C. PUSILLA*, var. *TERRICOLA*, Say.—Noire en dessous ; elle diffère de la *C. pusilla* en ce qu'elle a des marques obliques sur les élytres, descendant vers la suture. Territoire de la baie d'Hudson, selon Schaupp.

*C. CINCTIPENNIS*, var. *IMPERFECTA*, Lec. Une très-petite espèce (11 à 12 mm.), brune en dessous ; les élytres avec lunule humérale très longue se joignant ordinairement à la bande médiane ; celle-ci n'atteint pas la marge des élytres et sa partie extérieure se joint quelquefois à la lunule du sommet aussi bien qu'à celle de l'épaule. Trouvée dans la Colombie anglaise par A. J. Hill.

*C. LEPIDA*, Dej.—Élytres blanches avec quelques lignes vertes ou bronzées. Dernier segment ventral jaune roussâtre ; labre unidenté. Terr. du Nord-Ouest.

GERMAIN BEAULIEU.