

NOTES THERAPEUTIQUES

Dr L. E. FORTIER, Professeur de Thérapeutique, et Dr M. H. L. EBEL, Assistant à l'Hôtel-Dieu.

LES ALCAALINS DANS L'HYPERCHLORHYDRIE.

Dans les cas d'hyperchlorhydrie, les alcalins doivent être administrés dès qu'apparaissent les phénomènes précurseurs de la douleur : renvois, aigreurs, pyrosis, crampes d'estomac (A. Robin). Mieux vaut peut-être encore ne pas attendre le début des accidents. Le bicarbonate de soude exerce une action chimique neutralisante des acides stomacaux, mais en plus, il produit une action excito-motrice, par le gaz carbonique qu'il dégage. Ce dernier effet a pour résultat de distendre dans une certaine mesure l'estomac et d'ouvrir le pylore, d'où évacuation plus rapide du contenu stomacal (Soupault, *TH. de Binet, Paris, 1905*).

Il est donc indiqué de prescrire le bicarbonate à petites doses, régulièrement espacées, dans tout le cours de la journée, sans s'occuper de l'heure des repas. Dans l'hyperchlorhydrie, l'estomac se vide mal; des doses fréquentes de bicarbonate ont pour effet d'assurer l'évacuation de l'estomac : le médicament sera pris de deux en deux heures, de 8 heures du matin à 8 heures du soir. L'hygiène alimentaire sera rigoureusement observée; régime lacté au cours des grandes douleurs, et ensuite, au bout de quelques jours, purées et œufs. La prescription fréquente du bicarbonate semble autoriser une reprise des aliments plus rapide.

M. Soupault prescrit: Bicarbonate de soude, 0 gr. 50 Craie préparée, 0 gr. 50 Sous-nitrate de bismuth, 0 gr. 50 Magnésie calcinée, 0 gr. 50.

A prendre par fortes pincées, ou cuillerées à café, toutes les deux ou trois heures.

M. Linossier ordonne: Bicarbonate de soude, 20 gr. Magnésie calcinée, 5 grammes Sous nitrate de Bismuth 2 grammes, une pincée sur la pointe d'un couteau.

La formule suivante est de M. Huchard (*Consult. Méd. 3e édit.*): Bicarbonate de soude, 60 grammes Phosphate neutre de soude, 30 grammes Craie préparée, 10 gr. deux heures après les repas, une cuillerée dans un peu d'eau.

Kalhané (de Vienne) formule: Bicarbonate de soude, 40 grammes Magnésie calcinée, 40 grammes à prendre de même.

Dans l'hyperchlorhydrie, l'élément spasmodique du pylore joue un rôle. Pour obvier à cette complication, on ajoute aux poudres précédentes de la belladone ou de la codéine: Lactose, 7 gr. 50. Magnésie calcinée, 2 gr. 50. Sous-nitrate de bismuth, 2 gr. 50. Craie préparée, 3 gr. Codéine, 0 gr. 05 à 0 gr. 10. Bicarbonate de soude, 6 gr. P. 10 paquets. (A. ROBIN.)

M. A. Robin prescrit un paquet au moment des douleurs.

Nous avons vu que la conduite de M. Soupault n'est pas d'attendre la douleur et de faire prendre la dose par intervalles réguliers dans le courant du jour: Bicarbonate de soude, 0 gr. 25. Craie préparée ou Magnésie calcinée, 0 gr. 25. Poudre de belladone, 0 gr. 02. pour 1 paquet.

M. Binot (*loc. cit.*), recommande un de ces paquets de deux en deux heures ou de trois en trois heures de 8 heures du matin à 8 heures du soir. On commence par les prises répétées toutes les deux heures, puis on élargit peu à peu les intervalles. Si la constipation est forte, on prescrira plutôt la magnésie associée à ces cachots. Existe-t-il de la diarrhée? On recourra plutôt à la craie préparée.

La prescription fréquente et systématique des paquets de poudres absorbantes semble supérieure à la méthode qui conseille d'attendre les premiers signes avertisseurs de la crise douloureuse. (*Anal. des Prat.*)

LA MEDICATION ACIDE

La médication acide réussit dans les cas de langue blanche, avec bouche pâteuse, ou encore de troubles diarrhéiques. Elle est en général contre-indiquée dans les phénomènes douloureux qu'elle exagère volontiers; quand on l'emploie, mieux vaut ne pas administrer de lait dans le repas qui suit l'ingestion du remède.

L'acide chlorhydrique est le plus usité en thérapeutique gastrique; Contard emploie les acides sulfurique et nitrique.

On administre l'acide chlorhydrique soit avant, soit après les repas, pour exciter la fonction sécrétoire de l'estomac ou suppléer à l'insuffisance de l'acidité gastrique.

Soupault (*Traité des Malad. de l'Estomac, 1905*), recommande diverses formules.

L'acide chlorhydrique officinal est une solution contenant 34 p. 100 d'acide pur; il est prescrit à la dose de V à XX gouttes par jour, dans un verre d'eau, pure ou sucrée, ou mélangée d'un peu de jus de citron, ou additionnée d'un demi-blanc d'œuf battu, pour diminuer l'acreté de la sécrétion.

On peut encore user des mélanges:

Acide chlorhydrique, 2 grammes

Sirop simple, 200 grammes

Alcoolature de citron, 2 grammes.

M. Une cuillerée à soupe dans un demi-verre d'eau, une demi-heure après les repas.

Acide chlorhydrique officinal, 2 grammes

Eau distillée, 150 grammes.